

→ 即施行中剪枝，以利採摘作業之進行。

2. 茶園生產量達到最高峰後，茶樹經施肥後產量未再增加，反而有降低時，應施行中剪枝，其高度以茶樹之一半約45-50公分左右，施行水平剪枝。

(三) 深剪枝

1. 茶樹生長勢衰弱，無法以中剪枝使茶樹恢復其樹勢時，則應實施深剪枝，其高度則於距離地面20-30公分左右施行水平剪枝。

2. 深剪枝後第一、二年內讓其充分成長，再酌予摘心。

3. 深剪枝後第一年冬季剪枝時應比去年深剪枝面高10公分左右施行平行剪，第二年起距離去年面高出5公分左右剪成淺弧型。

(四) 樹邊修剪

為便利田間作業，茶樹兩側應適度修剪保持茶樹行間20-30公分之空間。

有機質肥料的施用

台灣位處亞熱帶，氣候高溫及多

溼，土壤中有機物分解較快，土壤中的養分亦因此很容易被淋溶而流失。因此本省茶園有機質含量普遍偏低，加上長期施用化學肥料，致使土壤酸鹼度低，亦即土壤呈現酸化的現象，土壤物理性劣變，影響茶葉產量及品質甚鉅。

因此，在冬季茶園中耕時適當的補充有機質肥料（動物性或植物性有機質肥料），調整其酸鹼度，改善土壤的團粒構造，使土壤環境更適合茶樹生長，對增進翌年春茶產量及茶葉品質俾有幫助。

灌溉



當土壤水分不足時，植物水分生理代謝即失調，葉片光合作用能力及養分吸收相對降低。因此茶園遇到乾旱時，茶樹生育不良，茶芽萌芽發育受阻，茶菁產量無法提高，茶葉品質自然亦下降。

尤其到了冬季氣溫逐漸轉涼，雨水亦較少，當茶園土壤呈乾燥狀況時，必

紅龍果 苗木批發
徵全省經銷商

大茂種苗園 TEL:(06)585-1999
高山青(漳州)農業有限公司 手機:090742119

◎ 裁種技術附回郵100元向本場索取 ◎

本場採組織栽培(無性)繁殖，
不帶苗不變種的幼苗。

科技及安全的種苗成品

◎ 1997品種
火龍果・香龍果・巨龍果・天龍果・
黃龍果

◎ 1999新品種：
尊龍果・祥龍果・大龍果・甜龍果・
蜜龍果・金龍果

◎ 業務內容：

1. 紅龍原種供應
2. 紅龍果組織培養、瓶苗出售
3. 紅龍果園各種器材、平價供應
4. 各品種：嫁接苗、扦插苗、批發零售
※ 徵全省經銷商※
5. 可台灣接單大陸提貨

大茂種苗 安全種苗 大茂種苗 科技種苗 大茂種苗 安全種苗 大茂種苗 科技種苗