

治上之依據。5公尺置一塊，高度以不超過作物生長點0-50公分為宜。

2. 田間管理：

雌成蟲偏好在通風不良與日照不足之環境產卵，尤其設施內如同給了一個溫暖的家助長其族群之增長，故宜保持通風。

豆菜或瓜菜類氮肥不宜施用過量。網室中如密度高時，早、晚由下往上噴水，高濕環境可降低族群及減緩其活動。

3. 化學藥劑防治：

- (1) 成蟲不擅長距離飛翔，主要靠風力協助遷移。寄主植物廣，實施共同防治可收事半功倍之效，其他寄主或雜草都要消除或同時防治。

- (2) 噴藥時應噴及葉背蟲體棲息處。

- (3) 在芥藍與花椰菜上可選用下列藥劑：

9.6%益達胺溶液1,500倍、2%阿巴汀乳劑1,000倍、2.8%畢芬寧乳劑1,000倍、25%布芬淨可濕性粉劑1,000倍及50%培丹可溶性粉劑1,000倍。果菜類之番茄推荐20%亞滅培可溶性粉劑4,000倍加組展3,000倍同時可防治蚜蟲、薊馬及小綠葉蟬。害蟲發生時7天噴藥一次。

4. 非化學藥劑防治：

4.5%苦楝油乳劑1,000倍加展著劑出來通4,000倍為低毒、安全，可使用於有機栽培作物上。

5. 宜採共同防治策略，選用較佳之藥劑交互使用。

農村攝影

喔！小心

文圖 / 李秋雄

當甘蔗採收機採收時，突然發現機械出了差錯，兩人便上去矯正，賣力修理；但工作及修理務必考量安全，必須小心喔！

