

一 受危害相當嚴重，致使植株失去原有綠色澤而被灰白及灰黑色之排泄物所取代。為專採收蒜苔之田園最重要之害蟲。

■ 防治方法

薊馬蟲體小，且苗期開始即可開始危害，卵產於組織中，蛹又在土中，不

易察覺，益增防治困難。以其世代繁殖快，一不注意則嚴重影響植株之生長，因此，在苗期一定要開始防治。薊馬發生初期可以20%亞滅培可溶性粉劑4,000倍加展著劑或9.6%益達胺溶液1,500倍防治，生育期畦上置藍色粘板可降低族群。

農村攝影


搶救果梅

文 / 曉寧

青梅採收後過去大多製成梅胚外銷日本，由於我國農業生產成本較高，面對大陸方面近年廉價競爭，使得我外銷競爭優勢相對降低。

寶島梅樹一般栽培皆採較粗放的管理方式，對整枝修剪工作較不重視，因此常導致樹型日趨高大，而必須以竹竿敲打枝葉的方式來採收果實，而極易造成果品的大量損傷，降低商品價值。其實，梅樹的整枝可採開心型的整枝方式，不但降低梅樹高度，並使日照通風良好，減少病蟲害。梅樹幼年期不需重剪，對於10年齡以上的成年樹，可依枝條分佈將角度不佳、著生位置過高的主枝或過密的枝條刪減或截短，採逐年進行修剪，將樹型矮化修剪至理想手採高度。

冬季休眠期中，氣候溫度低，樹體活動慢，此時進行修剪對樹體影響較小，因此矮化修剪時期應在此時期進行較佳，尤其觀光果園或果梅農友正宜趁時不可失。



晒梅（黃貴豪 攝）