




拜耳耐克螺

對人體最安全
的金寶螺殺螺劑

70%可濕性粉劑




使用方法

1. 整地、蓋平，灌溉後保持深度在3—5公分，讓螺鑽出土表並打破休眠。



2. 每分地均勻噴灑耐克螺40公克。



3. 施藥後不可再灌水及放水，保持至少24小時，之後再插秧。

作用機制

施藥後，耐克螺與螺體之呼吸酵素結合，造成螺體無法呼吸而窒息死亡。

注意事項

1. 請勿以施用三苯錫方法施用耐克螺。
2. 預知下雨或漏水田，請勿施藥或酌量加重藥劑。

毒性特低

項目	口服急性毒	皮膚急性毒	說明
耐克螺	半數致死量 大於 5,000mg/kg	半數致死量 大於 5,000mg/kg	低毒，對人畜安全，插秧前、後均可使用。
三苯錫	半數致死量 125mg/kg	半數致死量 500mg/kg	三苯錫造成指甲脫落，皮膚傷口潰爛及皮膚牛皮化。

※三苯錫——已被政府宣佈禁止販賣及使用

總代理：臺灣拜耳股份有限公司

台北市松江路237號11樓 電話：02-25087296~9

請洽下列經銷商購買

拜錫殺
台灣省農會附設各級農會農化廠
雲林縣新寮鄉甘西村中村一號
電話：06-5842101

螺速淨
惠光化學股份有限公司
台南縣麻豆鎮等子林17-10號
電話：06-5702181~9

刺螺寶
台灣南原農藥股份有限公司
台北市南京東路二段97號10樓
電話：02-25818156~8

寶螺丹
富農化學工業股份有限公司
桃園縣觀音鄉保福村九鄰草寮51-10號
電話：03-4834492

金德安
利豐化學工業股份有限公司
彰化市南安里彰興路154號
電話：04-7523105~7

新克螺
嘉農企業股份有限公司
新竹市南區里柳仔港46號
電話：035-762122~4

治螺
興農股份有限公司
台中市梅川西路一段23號
電話：04-3726181 (12線)

全方位產品 · 豐收的保證