

→ 糞、雞糞、豬糞尿、魚精、海藻精及蚵粉等。

市售袋裝有機質肥料品牌、種類繁多，堆肥製造業者使用的原料常就地取材，有的在堆肥中混入化學肥料如尿素、硫酸銨、磷礦石粉或矽酸爐渣等其他物質，因肥份各異很難掌握品質。

基肥施用以有機肥為主，分別在4至6月修剪、中耕作業及11至12月時分別施用。催花前以高磷成份的肥料為主，並配合鈣鎂肥的施用。

基肥施用可配合中耕作業一同進行。中耕在乾旱期間為之，宜避開雨期。中耕的位置最好在樹冠外下方，不宜太靠近樹幹部位。

中耕後因根受到傷害，不宜立即灌水，以免根部腐爛。基肥與化肥平均散布於樹冠下方，以中耕機翻耕入土使與土壤混合。

如使用未發酵的有機物，最好以微生物發酵的液肥進行澆灌，有機液肥以微生物、米糠、糖蜜、雞蛋、魚粉、骨粉、微量元素及少量化學肥料發酵而成。日後再視植株生育、果實發育階段

及品質進行有機液肥成分調整。

追肥以化學肥為主，在抽生花芽至中果期可依葉片顏色、植株生長勢提高氮肥及鉀肥比例，中果期以後以鉀肥為主，氮肥的施用視果實轉色與果實酸度調整。

栽培「珍珠拔」應注意氮肥施用切莫過量，氮肥過量易造成酸度過高影響品質，如果發現有元素缺乏症狀，宜利用葉面施肥。補充微量元素也忌施用過量。

為求品質的改進，建議平時對肥料使用種類、使用時期、植株生育狀況、果實品質均應詳細記錄。發覺問題時因有詳細記錄，也就比較容易抓出問題所在並加以改進。

肥培管理對「珍珠拔」果實品質影響甚大，如管理不善會造成果肉鬆軟、糖度低、酸度高等現象，無法發揮「珍珠拔」的特色，所以肥料的施用應謹慎小心。在提高品質與成本的考量下，農友應自行斟酌有機肥與化學肥的合理搭配施用，使成本降至最低。




豆雙牌 網室專用網

生產工廠

農、漁、牧、養殖業專用

木瓜網室防蟲專用網 · 蔬菜網室覆蓋網 · 養殖業保護網
防蚊網 · 溫室網 · 針織遮光網 · 高級紗窗網 · 建築用網



吉田塑膠織網股份有限公司

住址：彰化縣鹿港鎮彰頂路22巷137號
TEL: (04) 7711621 FAX: (04) 7716328