


婦女浣衣

文圖／林新欽



高雄市左營東側的蓮池潭，潭畔遍植楊柳，青青柳條低垂水面，每天黎明時分，潭畔有不少洗衣婦女，多是春秋

閣的老鄰居，她們挑著鋁桶或踩著自行車而來，前有半屏山及孔廟為伴，畫面返璞歸真，一幅好景緻。



乾並影響其景觀。

防治方法

對受害的蘇鐵，可進行修枝，盡可能去除危害嚴重的枝條，並集中燒毀，以避免成為另一害蟲來源。當蟲數量少時，可用軟毛刷或水沖掉附於莖葉上的蟲體。若遭大量危害時，慎選藥劑亦是緊急防治的一種方法。由於此類害蟲剛孵化的若蟲時期對藥劑之抵抗力最弱，此時施用噴佈莖葉之藥劑效果較佳，其主要施用藥劑、次數及間隔時期可參考植保手冊所推薦藥劑。

使用者可選擇合適之各類推薦藥

劑，且輪流使用以避免抗藥性的產生，如有機磷劑60%大利松乳劑稀釋1,200倍、50%撲滅松乳劑稀釋1,000倍、50%馬拉松乳劑稀釋500~1,000倍在害蟲發生時施藥一次，隔7~10天再施一次，共2次；油類95%夏油稀釋95倍在害蟲發生時施藥一次，隔7~10天再施一次，共2次，但樹勢衰弱時停用。

由於蘇鐵屬景觀植物，故全面噴灑藥劑亦可能對人體產生危害，故以保護瓢蟲的成、幼蟲、草蛉、寄生蜂等天敵的生物防治方法亦建議與其他防治方法配搭使用，以達最佳的防治功效。

