

桃芝颱風肆虐，果蔬受損嚴重， 台中區農業改良場提供菜園及果園之災害補救措施

台中區農業改良場 / 提供

桃芝颱風帶來豪雨，造成台中地區蔬菜產區嚴重積水，預期短期間內果蔬供應將失調，為使災害損失減至最低，台中區農業改良場提供菜園災後補救措施如下：

(1)及時復耕：請蔬菜育苗場加速供應種苗，水耕栽培農場由於不受天候之影響，亦請加速生產。至於受損嚴重之菜園，則請及時復耕，重新播種蔬菜。惟儘量種植短期葉菜類，如小白菜、千寶菜、葉蘿蔔、青梗白菜、芥藍、莧菜、薤菜、萵苣等。

(2)實施清園：剪除枯枝敗葉，清除落葉，以避免病害蔓延。

(3)排除積水：疏通或加深縱橫水溝，亦可利用抽水機抽水，俾使積水迅速排除。

(4)中耕培土：俟表土乾濕適當

後，實施中耕，並酌予培土及扶正植株，促進蔬菜恢復正常發育。

(5)扶正支柱或棚架：栽培蔓性蔬菜所用之支柱或棚架，如被颱風吹倒，應將其扶正，以利蔬菜能夠繼續生長。

(6)補施肥料：每10公畝（1分地）施用有機質肥料1.5~2公噸（堆肥、綠肥、洋菇廢堆肥、垃圾堆肥）為基肥及施用尿素20公斤（或硫酸銨44公斤）氯化鉀4公斤為追肥，促進發育。

(7)防治病害：災後蔬菜容易發生露菌病、白粉病、疫病、軟腐病等病害，應依照行政院農業委員會審訂之植物保護手冊的方式，加強防治。噴藥後，應注意安全採收期，避免農藥超量殘留於蔬菜上。

(8)整修設施：遭颱風毀損之設施，應即更新。

葉造成日燒現象。

4. 颱風過境後實施清園，撿拾落果、廢果集中深埋或燒燬，避免滋生病蟲原。

5. 注意防治炭疽病、疫病、瘡痂病發生。

△香蕉

1. 颱風過境提早採收成熟果。

2. 颱風過境後，即扶起倒伏植株並

於根際部培土。

3. 砍除嚴重折倒植株莖幹，並酌施肥料，促進吸芽生長。

4. 果房實施套袋，避免強烈日光曝曬造成日燒現象。

5. 颱風過境後立即實施清園，撿拾廢棄果，避免滋生病蟲原。

6. 注意葉斑病、軸腐病、炭疽病之防治。



→ 對此次果樹所受到之損害，呼籲果農應儘速進行相關復育措施，以避免影響日後生產並減少損失程度。有關颱風災後果樹之復育方法，可參考下述要點進行：

(1)果園復育措施：儘速將果園積水排除，植株被埋沒時及早清除，根部沖刷裸露時填補土壤。積水導致植株枯萎時，應適度修剪，減少葉片蒸散作用量。目前尚未採收果樹如文旦及柚類後應將受傷果實剪除，並依受損程度進行疏果，果園中落果儘速撿拾，避免腐爛滋生果蠅；龍眼容易產生果實病害，亦應儘快噴藥防治。

(2)果樹倒伏輕微可順勢扶正，倒伏嚴重時不能扶正，避免植株死亡。枝條折斷應剪除，以保護劑塗佈傷口。落

葉嚴重植株果實重新套袋或覆蓋遮光網，避免日曬發生日燒或胴枯病，除防止早期落葉外，可在樹幹塗佈石灰乳類或覆蓋遮陰物以避免傷害。

(3)進行適當的肥培管理：另外災後植株根部已經受損勿急於施用化學肥料，避免造成肥傷。如土壤流失致根部露出的植株填土後，可施用少量低濃度速效性追肥，葉面噴施0.1-0.5%尿素或速效性氮肥、胺基酸類等營養劑，可促進樹勢恢復。

(4)病蟲害防治：依果樹種類及生育階段病蟲害發生種類進行防治，颱風過後會造成植株多數傷口，易為病原菌入侵，在天氣放晴後應儘速進行防治工作。



**三冠牌
農林漁牧遮光網**
種類：平織、針織、鎖結
顏色：黑、銀、綠皆有
用途：遮光、防風、
防霜、防寒。

懸掛式遮光網
搭設不受地形或
崎零地影響，隨風
擺動，如森林般
清涼，通風性佳，
不怕強風。

**掛耳式
遮光網系列**
活動式搭設場合，
施工方便，省時、
省工、電動、手動
皆適宜。

能源節省布
具有遮光、防霧、防滴
水之效果，可隔離溫控
以外的空間，節省
能源。取代溫室內
傳統使用薄膜加
遮光網的麻煩。

防蟲網系列
木瓜專用防蟲網、
蔬菜防蟲網、果蠅網。
白、綠色皆有。

雜草抑制席
有效防止溫室、
果園、花園及空地之
雜草滋生，可免除草。
移動盆栽時不會傷及
伸出盆底之根部。

穴植網
依不同作物栽植間距
留穴植區，作業容易、
整齊。透氣性、透水
性佳。可抑制雜草
滋生，免除草。

**其他農業用
設施資材**

- 活動網室零組件、溫室零件
- 聚酯網線
- 貯水席(日本原裝進口)
- 固定帶
- 束束帶
- 粘扣帶
- 土木工程用布
- 水泥加勁纖維絲
- 網類製品依客戶需要縫合加工

煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興西勢村員鹿路二號
TEL: (04) 7773878 FAX: (04) 7773879