




潘清泉先生原屬燕巢果樹產銷班第16班，爲了擴大農場經營規模，自己成立裕泉農場，主要栽培番石榴，並且從事番石榴外銷工作。加入WTO後，國產水果面臨極大的壓力，爲抓住國人的胃口，提高國人對國產水果的忠誠度，他強調：農政機關應積極規劃國產品的行銷，甚至減少生產部門的經費挪用到行銷廣告都值得。

打拚要有方向
才能振翅高飛

文圖／才辰

造成爲害。若、成蟲棲息於葉柄凹陷基部，吸食汁液，食痕呈黑色斑點，使葉柄組織變硬脆，易於折斷，芋塊莖品質變劣。

■防治方法(參考)：害蟲初發生時任選下列藥劑一種，每隔7~10天施用一次，連續二次。

(1) 9.6%益達胺溶劑：每公頃每次用0.6~0.8公升，稀釋1,500倍。

(2) 2.8%畢芬寧乳劑：每公頃每次用1.0~1.2公升，稀釋1,000倍。

福壽螺 (Apple snail)

俗稱金寶螺、元寶螺、蘋果螺，初孵化幼螺取食芋株分蘖幼苗，漸次爲害

葉片、葉柄，當食物缺乏時，亦取食露出地面之塊莖，造成洞口或傷口，成爲軟腐病病原侵入感染途徑。

■防治方法

1. 在芋田灌、排水口處，設置阻隔網，防止螺體流入或流出。

2. 隨時檢除卵塊、螺體。

3. 芋苗種植前或種植後，任選下列藥劑一種施用，田間水位保持1~3公分，維持5~7天。

(1) 70%耐克螺可濕性粉劑：每公頃每次用0.4公斤加水稀釋施用。

(2) 80%聚乙醛可濕性粉劑：每公頃每次用1.2公斤加水稀釋施用。 