

一 使用對象：直徑0.3公分以上的作物種子。

使用方法：有2種，為液劑使用方法與乾粉使用方法。

液劑使用方法

1. 將種子放入容器或平面場地上。
2. 將白色粘著劑均勻撒入。
3. 加入搖勻的瓶裝接種菌液（如用噴霧可將粘著劑加入菌液中）。
4. 攪拌均勻，使種子濕潤。
5. 加入黑色粉末泥礫（吸收多餘水分），混合均勻後即可播種。

乾粉使用方法

1. 將種子放入容器或平面場地上。
2. 加入粘著劑。
3. 再加入清水（如用噴霧可將粘著劑加入清水中）。
4. 加入接種劑攪拌均勻。
5. 使種子上外覆一層粉劑後即可播種。

土壤直接施用法

使用對象：直徑0.3公分以下的作物種子或幼苗。

使用方法：分液劑使用方法與乾粉使用方法二種。

液劑使用方法

將種子播入土壤（或基質）前後，均可以用稀釋接種劑澆入穴中（稀釋500~1000倍），或將液劑與土壤（或基質）混合後，播入種子或栽植幼苗。

乾粉使用方法

將土壤（或基質）挖個洞，再將粉劑加入穴中，即可播種在粉劑之上，或將粉劑鋪放在土壤或基質上後，再播入種子或栽植幼苗。

使用量：種子外包覆法與土壤直接施用法的液劑以沾濕種子或土壤，粉劑以包得住種子的量為原則。

田間用量：

毛豆（撒播）：13公斤/1分地

紅豆（撒播）：9公斤/1分地

紅豆（條播）：7公斤/1分地

花生（條播）：15~18公斤/1分地

接種注意事項

接種液與種子拌種時，或種子加水時，必需把多餘的水倒出，絕不能浸泡種子，以免怕水之種子的發芽率及發芽勢受到影響。

根瘤菌接種劑不可與氮肥混合使用，但磷鉀肥仍需用，可於整地時作基肥施用，如需施用氮肥，可作為追肥，少量施用。

避免與農藥混合使用，但播種覆土後可施用農藥。

混合種子與接種劑必需立即播種，土壤不可太乾或太濕，避免雨天播種或播種後立即灌水。

接種劑必需儲藏於陰涼處，因為菌種是活的生物，有一定的保存期限（根瘤菌的有效期約6個月），當活的菌種數量降低時，效果將會減少。

為了使一般作物有最佳表現，土壤不宜太酸或太鹼。強酸性土壤可先用石灰質材，強鹼性土壤可施硫黃粉或酸性泥礫改善土壤酸鹼度後，再施用生物肥料，效果將更好。



逗鎮來去一、去又丕

— 台南縣左鎮鄉「四季水果工場」、「水果卡」

文圖 / 溫秀嬌

台南縣左鎮鄉，早期是西拉雅族新港社群支社之一，這個距台南市約40分鐘車程的小鎮，目前居住人口雖然不多，但因居民約有一半以上仍具平埔族血統，所以是個頗具「平埔味道」的小鄉鎮。

民國90年的炎炎夏日，在左鎮鄉「菜寮化石館」、「自然史教育館」前，有個平埔氣息濃厚的「水果嘉年華」被熱鬧的舉辦著，這項由中央和

地方上幾個機關團體協辦，由左鎮鄉農會主辦並延續9天的活動，主要也是慶祝農會「農業旅遊推廣中心」落成。

第一天開幕的活動，依序有農業生態展、民俗技藝、陶藝奇木花藝展、鄉歌分享、開幕來賓致詞、舞獅、武術表演、水果五項全能（猜重、猜價趣味競賽）、有機套餐、芒果品嚐、兒童趣味競賽



在玉南公路上看到它，就知左鎮鄉「農業旅遊推廣中心」到了



新落成的左鎮鄉農業旅遊推廣中心



莊轉心總幹事希望平埔族人能落實在產業中