

脈特別明顯。

傳播途徑：此病可經由帶菌種子傳播。田間病菌可經由雨水、灌溉水、農具或昆蟲，由病株散佈到健株。

防治方法：(1) 進行種子消毒。

(2) 生育期防除蟲害，並避免傷口產生。

(3) 發病初期以81.3%嘉賜銅可濕性粉劑稀釋1,000倍開始施藥，每隔7天施藥1次，連續3次。

病毒病害

病毒種類：Turnip mosaic virus (TuMV)

主要病徵：葉片出現明顯嵌紋，若苗期即受感染，植株生育停滯，呈萎縮狀。

傳播途徑：病毒可經由罹病植株汁液進行機械感染，或經由桃蚜、偽菜蚜進行媒介傳播。

防治方法：(1) 定期噴灑殺蚜蟲劑（如：18.2%益達胺水懸劑8,000倍、10.5%賽洛比加普乳劑1,000倍或24%納乃得溶液1,000倍），以防除蚜蟲。

(2) 做好田間衛生工作，疑似病株要立即拔除，避免因葉片磨擦造成鄰近植株感染。拔除的病株要集中燒毀，勿堆放於田埂邊，形成另一個感染來源。



「噴灑農藥中毒」事件

可以預防 → 電動送風呼吸保護具

FX-507型



ZING-500型



ZING-188型



全國最專業電動送風防毒面具進口、製造商



勤嘜股份有限公司

407台中市大墩路921號3F

各大農藥、農機行均售

TEL : (04)2321-0014 FAX : (04)2326-8832

E-mail : ZINGLIN@ms26.hinet.net