

麝香鹿的人工飼養

邱健人

麝香鹿、麝香都非常有名，誰都知道。但看過麝香鹿或麝香的人並不多。

依“本草綱目”記載，麝又稱為“名射父、香獐”。是哺乳動物的一種，屬偶蹄類鹿科野生珍貴動物。現在在大陸發現的麝香鹿有林麝、馬麝、原麝三種。其中原麝數量很少，較常見為馬麝。

麝香鹿主要分佈在西藏、四川、甘肅、陝西、湖北、貴州等省的極少部地區。雄性麝香鹿能產生一種香氣，即有名的貴重生藥材——麝香，在中藥是治療中風、腦溢血、心臟或腹部的激痛、瘡疾、腫痛引起的發熱、畏寒、毒瘡的藥。同時也是避妊、墮胎的特效藥。

麝香主要含有水分 22.56 %、灰分 3.62 %、含氮化合物 9.15 %、膽固醇 2.19 %、粗纖維 0.59 %、脂肪酸 5.15 % 及麝香酮 (Muscone) 1.2 % 等。

麝香的主要芳香成分為麝香酮，但又含少量的降麝香酮 (Normuscone)。

麝香也是一種重要的香料，由麝香製成香料，長期也能放出香味，故古代上等墨都加有少量的麝香，而作成“麝墨”，供畫字畫用，則字畫不但有香味，而且可防除虫害。

麝香是雄麝香鹿所特有的麝香囊分泌的一種物質。最初分泌出來麝香，是一種乳白的糊狀物，並未成熟。此種白色糊狀物。然後在香囊慢慢成熟，最後變成顆粒狀茶褐色物質。

雄的麝香鹿，在一歲半左右，開始分泌麝香，此時剛好也是發情期。而成年的雄麝香鹿，一年四季都可分泌麝香，而以春夏交配期最旺盛。

挖取囊中的麝香顆粒，稱為“麝香仁”或“散香”。而連腹皮也割下，陰乾後剪短毛的稱“整麝香”或“毛香”。

麝香鹿養殖場一般都選擇在海拔 1100 公尺，高山峰相連，有森林溪谷，並有泉水流經的地方，最為理想。

麝香鹿要人工飼養，首先要從山中捕獲野生的麝香鹿，通常在每年的八、九、十月間捕捉幼麝香鹿來飼養，最為理想。

麝香鹿所食用的食物很廣，桑葉、豌豆葉、高麗菜、山楂子、岩花樹的葉等都是麝香鹿喜歡的青飼料。而玉米、大豆，無毛豆類的葉乾燥後，都可以做為越冬的飼養。

麝香鹿性非常孤癖，又喜歡打架，故飼養時，需加以隔離，以防止死傷事故的發生。 ■

一般肉鵝飼養期約 14 周，可能因成熟度夠，加以能利用高纖維草料，致鵝肉具咬感佳、風味清淡、無腥味等優點，為極佳食肉來源。

製品多樣化 選擇空間大

鵝肉調理向以白斬沾佐料而食居多，這可能因鵝肉產量不多，價格昂貴，為顯現原料無庸並珍惜其原味，遂以最簡單方式烹調，期保留鵝肉的美味，然

而此在利用上終究太單調，鵝隻生產一但商業化，另謀製品多元之道實屬必要。

按照鵝屠體各部位肉特性與價值，分別試製各種加工品。胸、腿等完整塊肉製成燻煙鵝排、壓型火腿、貢丸、羅浮等高級產品，腿、碎肉製成法蘭克福香腸、肉棒，頭、頸、翅、腳等下腳則製成滷味。

如此，不但可達全鵝利用強化經濟性，且因製品多樣化令消費大眾有更多選擇空間，至此，以鵝肉製品為主體的大餐並非空言奢望。 ■