

迎春天使 胡蝶蘭

台北縣園藝公會 徐志成

夏季是胡蝶蘭生長最快速的季節，尤其當氣溫升到18~20℃以上時，此時期的生長勢更為明顯。在這個時候其莖部上會出現許多嫩葉，由於這些嫩葉需要足夠的養分才能生長，故須供給植株充足的養分和水分。

胡蝶蘭性懼強光，所以栽培上需利用遮光網、防寒紗網，遮擋70%~80%左右的陽光。夏季的降雨量較豐沛，濕度較高，所以儘量避免直接將水澆洒在葉片上。尤其在梅雨季節，冬天綿綿雨季，雨一下就連續好幾天，如果葉片無法保持乾燥，就會影響植株的發育。

胡蝶蘭性喜生長在晝夜溫差很大的地方，本省嘉義、埔里、南投一帶，白晝高溫、夜間涼爽之地很適合種胡蝶蘭。胡蝶蘭的生長環境必須通風良好，尤其是正值生長旺期的夏季，如果過於悶熱，便很容易產生軟腐病或黑斑病，因此，當嫩葉長出時，即須先噴洒殺菌劑予以預防。

胡蝶蘭的生長期遠較其他的洋蘭晚，因此，到了10月左右，許多洋蘭均已陸續進入生長停頓期。在新根長出的同時，老葉會逐漸變成褐色而掉落。

胡蝶蘭的施肥，夏季仍以每週一次為原則，使用液肥，連續施用到植株停止生長為止，若無法供給充足的養分，花期便可能因而延後。



花型平整一致(黃瑤娜 攝)

胡蝶蘭極易受到蝸牛危害，就其在剛吐花芽的時期，如果花芽受侵蝕，就無法開出花朵。胡蝶蘭的花莖感覺上亦較弱，尤其在冬季施肥對呈休眠狀態的植株會產生不良的影響，因此施肥多在春季。所以在高溫多雨的北部，培養胡蝶蘭會較在南部栽培更容易開花。

繁殖方面，由於胡蝶蘭不會長子株，因此不用分株，僅須做換盆的工作即可。換盆的時機以花期過後，新根長出之前換盆最適宜，亦即是在春末到夏初之間。換盆後移到半日陰處栽植，兩週內勿施肥，只須澆水即可。

小廣告

登本刊小廣告 費用少效果好

■ 每行14字收費100元 10行為限 ■

收
購

青梅
梅胚

(02)3143296 台北市內江街22號
龍格食品行廖先生洽

助聽器 37年老店
值得您信賴

業績居冠 · 最具規模 · 保障服務

獨一專門店 助聽器世家 5413525

台灣電氣企業 5512525

5637392

台北市中山北路2段25二樓(中山分局附近)