

雙溪鄉的艷紅鹿子百合

文／小石・圖／瑞芳地區農會

從高山走向平地的艷紅鹿子百合



從高山到平地，它沒有水土不服的情形。目前最大的問題是一矮化處理技術，以控制植株高度。

艷紅鹿子百合只能生存在峭壁上？近年來，隨著自然生態的遭受破壞，只分佈於北部石碇和基隆內寮一帶懸崖絕壁之上的台灣艷紅鹿子百合，數量愈來愈少，令人擔憂；在學者專家呼籲亟待保護之際，在台北縣雙溪鄉的水田裡，居然出現它的芳踪！

據瑞芳地區農會推廣股表示，艷紅鹿子百合由於外形艷麗，當地農友本來就有零星種植。農會的正式栽培計劃是78年才開始，經77～78年的二度育苗，目前共有8000株小種苗，可開花者達1300株，預計7月上旬可盛開。

艷紅鹿子百合繁殖並不困難，以鱗片扦插，45天可發芽。以種球播種的話，時間上亦相同，但出芽後則生長很快；直徑4公分以上的種球，如果不腐爛的話，幾乎都可成活。

從高山到水田，驟然的環境改變，它會不會水土不服？以目前試種的情況看來，艷紅鹿子百合似乎適應得蠻好。農民在水田裡作成50～60公分的高畦，才將種球或鱗莖種下，雖然播種時節正逢當地的雨季（10月下旬），但發芽並不受影響。在不遮陰的狀況下，植株可長到一米半高；若遮陰，則易有徒長現象。

植株過高是目前極須克服的問題。據農會推廣人員表示，目前雖有桃園改良場提供品種改良的技術指導，但最欠缺的則是矮化處理的技術，以便能控制植株的高度，符合商品價值。

艷紅鹿子百合獨特的外形，不管是切花或盆花，都是動人而搶眼的花卉。假以時日，必能搶攻花卉市場一席之地。 ■