

辛夷

它是什麼樣的花？

與辛夷長得最像的，莫過於玉蘭花了，但它們只不過是同一科的堂姐妹而已無怪乎辛夷被稱為“紫木蘭”，而玉蘭則稱為“白木蘭”。另外，我們所熟悉的玉蘭有清香，而辛夷則無。這下子，你會分辨了吧？

花姿高雅，滿樹紅紫的辛夷，是國人較陌生的木本花卉；然而，在我國大陸及日本等地，却到處都可以覓得它的芳踪，幾乎有庭院的民家、房舍，都會種上一、二棵，以觀賞它那一樹的紅紫，是為庭園高級的觀花樹木之一。

事實上，本省的高冷地風景區，如梨山、武陵農場、阿里山賓館、台大霧社的梅峰農場以及大家較為熟悉的陽明山、新店烏來地方的私人宅院中，均有零星或點綴式的栽培；而不能普遍被栽培的原因，主要還是性喜冷涼環境的因素。

辛夷別名木蘭或木蓮，是我國長江流域一帶原產的高級花木，自從流傳海外後，目前已成為世界各地有名的庭園花木。

莫把辛夷當玉蘭

辛夷的別名甚多，如李時珍本草綱目中云：“夷者蕘也，其苞初生如蕘而味辛也”，此辛夷之所以名辛夷之因；而本草綱目記載陳藏器說的：“辛夷花未發時，苞如小桃子有

學名：*Magnolia liliflora*
Desr.
英名：Lily Magnolia
日名：モクレン、モクレンゲ、シモクレン
別名：木蓮、木蘭、木筆、紫木蘭、迎春、杜蘭、林蘭、黃心、辛雉、猴桃、房木等。
科別：木蘭科
原產地：中國
觀賞期：2～5月
用途：藥用、切花及庭園木



毛，故名猴桃。初發如筆頭，北人呼為木筆。其花最早，南人呼為迎春。”此外，據古今圖書集成草木典辛夷部的記載，古時候還將辛夷叫做“辛雉”和“房木”呢！

至於其他的別名，也是有緣由的，例如辛夷乃木本植物，其花香如蘭似杜，故名木蘭、杜蘭、林蘭；其花形如蓮，故名木蓮；其木心黃，故名黃心。

也許你對辛夷還是感到很陌生，再者，也許你會將它誤以為是白玉蘭。事實上，辛夷、白玉蘭以及大家所熟悉的含笑花等，都是同一科的堂姐妹。

在我國由於自唐代開始便普遍栽植，所以，大陸上留有許多不少的好品種。在眾多的堂兄弟姐妹中，“白木蘭”（俗稱玉蘭）是長得最像辛夷的一種，除了花呈白色以外，外形酷似辛夷，也因此而常被誤以為是白色的辛夷品種。

聽說在北京頤和園裏，有一棵高大的白木蘭樹，素靜凝寒，姿態高雅，很得晚清民初畫家一齊白石的喜愛，常常以它入畫；但是在畫上題字時，却將這花誤作木筆（即辛夷），如：“二月春風長綠苔，昏昏不覺上階來，兒孫笑折花枝倒，才曉牆頭木筆開”等。

其實，辛夷與白木蘭是兩種植物，古詩上早已分辨得很清楚，例如王維輞川別墅中的辛夷塢，曾有詩描述說：“木末芙蓉花，山中發紅萼，澗聲寂無人，紛紛開且落”，而斐迪和的詩也說：“綠堤春草合，王孫自流氈，況有辛夷花，色與芙蓉亂。”……這都足以說明，色與芙蓉亂的辛夷，花

是紅色的。無怪乎後來植物學家要將辛夷叫“紫木蘭”(學名為*Magnolia liliflora* Desr.)，而將玉蘭稱為“白木蘭”(學名為*Magnolia denudata* Desr.)的原因。

而另一個最大的分辨法是：辛夷的花沒有芳香味，而玉蘭則帶有清香，風來微送幽香，令人心曠神怡。

辛夷屬於木蘭科木蘭屬，原產於中國。辛夷的植株高大，株高可達3~5公尺或更高；樹幹直立，樹皮灰白色，小枝平滑，帶褐綠色或綠紫色，有明顯的皮孔。葉互生，倒卵形，全緣，葉面濃綠光滑，無毛，但幼葉及嫩芽均有細絨毛，長大後脫落；葉長約8~18公分。

花先葉而開放，有時則與新葉同時開放。辛夷的花大多開於枝端，單生，為大型的紫紅色花，花瓣卵狀長橢圓形，外側濃紫紅色，內面則呈淡紫紅色；每一朵花有3枚卵狀披針形、紫紅帶綠色的小形萼片，花瓣6枚，3枚一層，排成二層，花朵長約10公分。

花朵碩大、花色優雅、花姿華貴的辛夷，除了可供作庭園花木觀賞外，也適合大型盆栽栽培及供作切花；此外，尚可供作藥用。辛夷的樹皮、葉

片和花朵，都含有揮發性油，採取未展開的花苞，剪去枝梗，乾燥後可供藥用，除治療鼻塞等鼻病外，也可作鎮痛劑，用以治療頭疼和牙痛等疾病。

栽培與管理要訣

·日照：性喜陽光，宜植於向陽且不積水的場所。

·溫度：性喜冷涼或溫暖，忌酷熱，能耐寒冬，本省中、高海拔的冷涼山區較適合栽植。此外，北部天氣較中、南部冷涼，可試著栽培看看，其生育適溫約15~25℃。

·土壤：對土壤的選擇較苛刻，貧瘠和透水性差的土壤均不適合；宜選擇不積水、肥沃的砂質壤土來栽植，生育較佳。庭園中若土壤過於貧瘠，應先進行挖掘植穴，進行客土及預埋堆肥。

·澆水：辛夷雖然根群忌積水，但又不可過於乾燥，土壤應經常維持濕潤而不乾旱。山坡地的向陽處最適合種植，因此處不僅陽光充足，又不怕土壤積水，所以，生育較佳。

·施肥：辛夷與其他木蘭科花木一樣，吃肥較重，可每季施肥一次，肥料種類以腐熟有機質較佳。

·繁殖：可用種子播種、扦插、高壓及嫁接法。種子播

種可在春、秋兩季進行，從播種到移植，一般大約需要2年的時間，而定植後至開花，則又要等上好幾年，所以，這些實生苗，大多被利用為嫁接時的砧木。扦插則以花期過後的4~5月或秋天進行，插穗可選自2年生以上的健康枝條，所得的苗木可比實生苗早一年移植，而且開花較早，有時移植後第二年即可開花，所以，較常被利用。至於嫁接法，除了以實生苗作砧木外，也可以白玉蘭的實生苗作砧木，芽接或切接均可，但較為麻煩，所以少有人使用。

移植的注意事項

由於辛夷係直根系，不耐移植，除了應選對時機(早春或秋天落葉後)，根部要多帶一些土(即根團要大)；成樹移植時，切記於半年前需先行斷根處理，否則很難成活。

開花後處理

為使植株長得茂盛且姿態優雅，可於花後進行修剪，但切記必須於5月底之前進行。因為辛夷於5月以後即開始進行花芽分化，因此5月以後應儘量避免修剪，以免剪去花芽已分化完成的枝條，而影响翌年春天的開花。 ■

播種、扦插、植物 德國產 育成及移植專用 泥炭苔

一般的泥炭苔乾燥後，不易吸收水分，本製品經長年研究，適當調配分解程度不同之泥炭苔，添加肥料，微量要素及特殊吸水劑(有德國專利)，可立刻吸水即可使用。

適於播種、育苗、培植等用途。

(02)717-3900台北郵政81-171信箱 郵政劃撥0111559-5周光邦帳戶

台灣的野生蘭

增訂四版·全書276頁
定價340元

豐年
叢書



台灣的野生蘭第三版介紹台灣野生蘭54屬110種，彩色圖片36頁。主要內容：認識蘭科植物，野生蘭之鑑賞，十步之內必有芳草，野生蘭栽培繁殖，有價值的台灣野生蘭，及蘭科植物形態術語，台灣野生蘭產地氣候，台灣野生蘭栽培法分類概要，中英文對照。蘇鴻傑博士編著

豐年社

台北市溫州街14號 電話(02)3628148
郵政劃撥0005930-0豐年社
郵購每次另加掛號郵資45元



顏色淡雅的日本辛夷。



花色紫紅的辛夷，又有紫木蘭之稱。



花先葉而開放，盛開時如蓮，又稱“木蓮”。



在日本，辛夷是很常見的庭園觀賞樹。

定價 / 470元

豐年叢書 / 最新出版

花卉害蟲彩色圖說

王清玲博士著

● 主要內容：

- 〈1〉昆蟲及花卉蟲害問題
(昆蟲的外形、昆蟲的發育及繁殖、昆蟲的重要習性及其對環境的反應、花卉害蟲問題的特性)
- 〈2〉花卉害蟲防治
(耕作管理的配合、利用誘引或忌避物質、土壤處理、生物防治、藥劑防治)
- 〈3〉花卉害蟲及有害動物
(花卉害蟲類別簡易區分法、害蟲種類介紹)
- 〈4〉花園常見的有益昆蟲
- 〈5〉常見花卉害蟲名稱
- 〈6〉殺蟲劑中英名稱對照表及索引

- 全書16開豪華彩色精印
/ 166頁 / 彩色照片230餘張
- 80年5月1日出版 / 定價470元
(郵購每次另收掛號郵資45元)



郵政劃撥0005930-0豐年社
台北市溫州街14號
電話(02)3628148
傳真(02)3636724



螳螂(黃芳溢 / 攝)



椿象(劉盛興 / 攝)



蟬(黃芳溢 / 攝)



蝗(曾文田 / 攝)



天牛(曾文田 / 攝)