

常春藤

室內綠化、牆垣攀爬 地被利用的好材料

你可能有過這種經驗，在冬天時很鮮嫩漂亮的葉片，一旦氣溫漸升，尤其過了夏天，常春藤的葉片便百病叢生，完全失去了光彩。夏天，應為它找個冷涼通風處，並經常噴佈細霧水，方可助其安然度過夏天。

常春藤可說是世界性的植物，地球上之溫帶與亞熱帶地區，各處幾乎都可見其踪跡，廣受世人的喜愛。台灣的花市也少不了它，在本地我們都是種成吊鉢的方式，懸掛在沒有直射陽光的陰棚、大樹冠下或室內供觀賞。它們的生長情況並不是很好，在冬天時很鮮嫩漂亮的葉片，一旦氣溫漸升，尤其過了夏天，葉背後便慢慢密佈了各種病蟲、病卵與病屎，葉色黃白枯乾，完全失去了光彩。

若你到過日本或歐美國家，會發現常春藤有非常多樣化的利用方式，戶外的棚架、牆垣、屋緣、基角，以及地表的被覆，街道上的裝飾性盆鉢，處處所見到的常春藤，都生長得好旺盛，甚至在盛夏的七、八月間，乾熱不亞於台灣之時，竟也無一絲病態，葉片仍然肥碩鮮綠。真令人納悶，不禁想了解探究，在台灣栽培這舉世聞名的常春藤，究竟是那方面出了問題？

常春藤乃泛指五加科 (Arabiaceae) 常春藤屬 (Hedera) 的一大群植物，英名泛稱為 Ivy。本屬植物一般常見者雖僅有 5 種而已，但由其中所衍生出來的園藝栽培品種或突變種，其數目就相當驚人可觀了！這群多年生常綠性的蔓藤，原產地就在歐洲、西亞與北非之溫帶或亞熱帶地區。

單葉互生，莖初為草質極為柔軟，而後呈木質化之硬枝。莖節嫩梢之年輕枝條，其節處易發生氣生根，有助其莖枝的攀爬；老化的枝條，其節處則不會發生氣生根，攀爬能力也喪失了！葉形

也因年齡而有所不同，嫩枝上之葉片多為掌狀裂葉；老齡枝上的葉片則不再有缺裂，多呈卵形等。嫩枝與成熟枝條另一點最大不同是開花結果，當然是成熟枝才會開花結果囉！

常見的品種

常見的常春藤有 2 種，但由它們所衍生出的品種與變種就不計其數了！

1. 阿爾及利亞常春藤

學名：*Hedera canariensis*

英名：Algerian ivy, Canary ivy, Madeira ivy

此種原產地在北非的加那利群島，1833 年英國就在苗圃商業化栽培下而推出於市場，開始受到世人的矚目。它具有一明顯的特色，就是枝條與葉柄都是紫紅或紫褐色。葉片也較大些，葉面徑可達 10~15 公分。幼葉卵形，全緣或掌狀 3~7 淺裂；成葉則呈卵披針形。此常綠性的藤本，生長速率倒比其它種要來得緩慢。此種因葉色全為綠色，受歡迎程度就遠不及下列的一些斑葉種了！

• 白玉常春藤

學名：*H. canariensis* cv. *Variegata*

英名：Variegated Algerian ivy

此種栽培得相當普遍而廣泛，常被稱為“Glorie de Marengo”，葉色非常地漂亮，葉緣鑲著奶白色的斑邊，或偶而攙雜著粉紅斑彩，葉身、掌狀脈處則呈鮮綠至灰綠，並夾佈著藍綠色的斑塊，色彩自然而多變化。

適合生長的溫度範圍在 10~20℃，

阿爾及利亞常春藤是地被的好材料



日本常春藤生長慢，是小品盆栽的極品。



冬天10℃以下會生長停止而呈休眠狀。4~8月是生長旺季，澆水須勤快，1~2星期追施一次完全化學肥料，速效性肥，葉色可一直保持該有的色彩而不會黃化褪色。夏天，氣候乾熱期間，最容易引起許多病蟲害的侵犯，如紅蜘蛛，它會寄生於葉背，吸收汁液而使葉面變色，黃化而顯得枯乾、萎縮劣化。最佳防禦方法，可經常地於葉背噴佈細霧水，因紅蜘蛛怕水，可有效阻遏之！

在台灣平地，比較有問題的是燠熱的夏天，大家都習慣把它們吊掛在乾燥的室內，乾與熱此二因子就足以使葉片

橢圓形，沒有缺裂。

此種性喜冷涼，生育適溫在5~15℃，在台灣平地的夏天，若不是靠著噴霧來降溫並製造濕度，以防病蟲的侵襲，是相當不易度夏的。

繁殖也多以枝條扦插為主，因嫩枝（尚未木質化者）之莖節處已有不定根之潛伏，故扦插生根很容易。另外亦可用壓條來繁殖，把蔓性的枝條，壓入土中並固定住。壓入土中的部份，葉片當然得摘除。亦有用嫁接法來繁殖的，尤其針對一些斑葉種，性狀不穩定，其它繁殖方法可能不易保有其斑色特點，可

黃邊常春藤葉色明亮動人，極受歡迎。



劣化至難以回復的地步，夏天過後，植株只有往垃圾筒一丟了！所以，夏天應找一冷涼之通風處，如大樹下，或室內朝北的窗口、通道等，並經常噴佈細霧水，助其安然度夏，秋涼後問題就比較少了！

繁殖並不困難，多採用扦插法，採取5~10公分的枝條，留2~4片葉子，將插穗之1/2~1/3埋入繁殖用介質中，生根相當容易。

2. 洋常春藤

學名：*Hedera helix*

英名：English ivy, Common ivy

此種原產地在歐洲與北非，莖枝與葉柄非呈紫褐色，葉片也較小些，多在10公分以下。典型的幼葉呈掌狀5裂葉，葉面平滑無毛，葉長5~8公分，暗綠色的葉面，脈却呈色淺之奶白色。而能開花結果的老枝上的葉，多為卵形至

用此法。砧木可用熊掌木，配合4~10公分長的接穗，嫁接後在3星期內就可長出癒合體，而後得到一性狀穩定的斑葉種常春藤。

洋常春藤也有許多斑葉品種，常見者如下列：

- 撒金常春藤 (cv. Gold Dust)
蔓性，掌狀三裂葉，綠葉面上雜佈著黃、白的斑點。
- 金心常春藤 (cv. Gold Heart)
蔓性，小型葉片，掌狀3~5裂葉，綠葉之中央有乳白、乳黃之斑紋。
- 硬枝常春藤 (cv. Arborescens)
常綠性小蔓灌，枝條呈直立向上生長狀，卵形沒有缺裂的葉片。
- 多脈常春藤 (cv. Fan)
蔓性，葉呈掌狀5~7淺裂，葉身寬潤，葉面深綠色，掌狀脈多條則呈淺綠色。裂片呈波浪狀，裂片凹處為裙褶狀，僅葉身中央平展。

▶ 綠化少不了它

常春藤是台灣花市中的常客，相當地通俗而廣受大眾的喜愛，因來自較冷涼的地區，因此一到夏天，在乾燥室內吊掛的常春藤，就易受到病虫侵襲，生長衰弱後，病害也不放過它，因而生長劣化甚至死亡。若有冷涼的環境，並增加空氣濕度或葉面噴水霧，都可以助它度過炎熱而乾糙的夏季。

耐陰的常春藤，具有多變的葉形與富麗多彩的葉色，不僅可做戶外地被利用，岩壁、屋基都可攀爬、貼生，當然更是室內吊鉢的好材料，室內綠化少不了它。



常春藤的蔓垂覆蓋性，可美化生硬的牆垣。



白玉常春藤的莖枝及葉柄紫褐色，葉緣有乳白鑲邊。



常春藤是相當大眾化的盆栽禮盒



各式常春藤是室內吊鉢的寵兒

新書預約・特價優待

使你的花兒更美麗・更有價值！

花卉害蟲防治第一本專書

花卉害蟲彩色圖說

——王清玲博士著——

定價：470 元

預約優待價 376 元

(即日起至80年4月30日止)

- 主要内容 / 包括：一、昆蟲及花卉蟲害問題(昆蟲的外形、昆蟲的發育及繁殖、昆蟲的重要習性及其對環境的反應、花卉害蟲問題的特性)，二、花卉害蟲防治(耕作管理的配合、利用誘引或忌避物質、土壤處理、生物防治、藥劑防治)，三、花卉害蟲及有害動物(花卉害蟲類別簡易區分法、害蟲種類介紹)，四、花圃中常見的有益昆蟲，五、常見花卉上害蟲名稱，六、殺蟲劑中英名稱對照表及索引等。
- 全書16開豪華彩色精印，166頁，彩色照片230餘張。
- 預定80年5月1日出版，定價470元，即日起至4月30日止匯款預約者僅收376元(郵購另加掛號郵資45元)

豐年社

郵政劃撥0005930-0豐年社
台北市溫州街14號
電話(02)3628148
傳真(02)3636724