

●綠化系列

緬梔

花冠中心帶有黃色斑塊，
似雞蛋的色彩一般，
又名雞蛋花。

當3~4月間，繁花綠葉將大地點綴得多彩多姿之際，雞蛋花却依然“老神在在”，如同枯木般的立在庭園中。但4月一過，它便如大夢初醒般的睜開雙眼，展開雙手，加入綠化大地的行列。

“緬梔”這名字，對於許多人而言，也許較為陌生；然而，一提起“雞蛋花”，却是大家所耳熟能詳的。

雞蛋花四季風情

雞蛋花可以說是隨季節變化最多的庭園植物。當3~4月間，正逢萬物復甦之際，繁花綠葉將大地點綴得多彩多姿的時候，雞蛋花却依然“老神在在”，如同枯木般的站立於庭園中，光禿禿呈叉狀的粗壯枝條，橫展於主幹上，猶如群鹿的“角”一般，也因此，雞蛋花又有“鹿角樹”的雅稱。

而鹿角般的樹枝，對它不夠了解的人，却常誤以為它已枯死了，而將它鏟除掉；却不知它在4月一過，進入5月初夏時分，雞蛋花便如大夢初醒般的睜開了雙眼，展開雙手加入了綠化大地的行列。

首先，於各枝極頂梢展露出一絲絲的綠意，然後逐漸擴大，伸展成一片片、一叢叢的綠葉；而到了6~8月間，於葉叢中央終於綻開出美麗芬芳的花朵，在薰薰然的南風輕拂下，飄送著絲絲的馨香，一下子之間，却也舒解了不少

學名：*Plumeria* L. (緬梔屬)

Plumeria obtusa L. (鈍頭緬梔)

Plumeria rubra L. (紅花緬梔)

Plumeria rubra L. var. *awtifo-
lia* Bailey (緬梔)

英名：Frangipani

日名：プルメーリア屬

別名：雞蛋花、印度素馨、鹿角樹、蕃仔花

科別：夾竹桃科

開花期：4~11月，以6~10月開花最盛

原產地：①鈍頭緬梔原產於墨西哥。

②紅花緬梔原產於墨西哥、委內瑞拉及西印度群島。

③緬梔原產於熱帶美洲。

用途：大型盆栽及庭園樹，花則可以作為香料。

炎夏間的酷熱，使大地顯得更加的平和與寧靜。

花期過後，到了12月入冬之際，也正是它落葉的時候，此時雖然僅有光禿禿的枝極，但却別有另一種冬景之美。


初夏最明媚的花樹

緬梔屬於夾竹桃科緬梔屬（亦有稱為雞蛋花屬），為多年生的落葉小喬木。株高4公尺以上，有的更可高達15公尺左右。樹皮呈灰褐色，枝幹粗壯，呈叉狀生長；而枝幹雖然粗壯，但却柔軟多肉，若將其樹皮割傷，或枝幹折斷時，都會有白色乳汁流出。此乳汁有毒，勿以手觸摸，以避免誤食或引起皮膚過敏。

披針形或長橢圓形的葉片，互生於枝條先端，長約20~35公分，厚革質、全緣，表面光亮且有明顯的羽狀脈，其葉柄亦頗粗壯。

花頂生，可自5~6月開到10~11月間，是初夏至秋天之間開花最明媚的樹木之一。多數的花朵聚合成聚繖形花序，小花具長花軸，花冠盆形，5裂，花萼則極為細小，不大顯著。小花盛開時，其花徑可達4~6公分，花冠外部呈乳白色，中心基部帶有黃色斑塊，似雞蛋的色彩一般，故有人稱它為“雞蛋花”；而雄蕊則著生於花冠筒基部，如不細心觀察，則常常會忽略了它的存在。

而另一有關於“雞蛋花”之名的緣



由，則來自其果實。緬梔的花具芳香，可供作香料；花謝後，也會結果，果實為蒴果，革質，長橢圓形，大小有如雞蛋一般，或許這也是雞蛋花名稱的來源之一吧！果實中含有多數的種子，種子有翅，不過，在本省種植的緬梔，少有結果。

除了開乳白色花的緬梔外，亦有開桃紅色、雙色、橙紅色的緬梔，但本省栽培較少。

栽培與管理要訣

●日照：於全日照或半日照的環境下，均可生長良好；唯忌陰暗的環境。若於弱光下，植株易生徒長，開花也較差，再者，常會提早落葉。所以，應選擇向陽處栽種，方能欣賞到美麗的花朵。

●溫度：性喜高溫乾燥的緬梔，其耐寒性甚差，所以，北部地區在尚未進入嚴冬，大概於11月底至12月上旬，就開始產生落葉，到了真正的冬天，則全樹光禿禿的，雖然如此，還是頗具有可看性的。

●土壤：所栽培的介質忌積水，且必須排水性佳，故一般均以排水良好且富含有機質的砂質壤土作為栽培介質。若想種於大花盆中，只要將河砂、腐熟雞糞、稻殼或細碎蛇木以3：1：1的比例混合後，作為培養土即可。此外，於雨季必須注意盆土的排水，不可有積水的現象發生，以避免根部產生腐爛。

●澆水：由於枝幹本身多汁，所以

，不必經常澆水；但3~5月間，生長旺盛時期，可供應充足的水分，以利生長；而開花期間，則應限水，使產生飢餓狀態，以利於開花。

●施肥：由於花期甚長，所以，肥料的供給應充足，除了基肥外，生育期間可每隔45~60天施用一次腐熟有機肥或磷、鉀化學複合肥為宜，以利於開花不斷。


●繁殖：以種子播種及扦插法為主，早春為繁殖適期。早春選取去年生較粗壯成熟的枝條，長約15~20公分，作為插穗。而因插穗剪下後易流出白色乳汁，需先置入水中，浸泡數小時，方可扦插於苗床上；否則乳汁凝固後會阻碍木質部的吸水，而使得成活率降低。扦插後，保持適當的濕度，大約經45~60天方能長根萌芽。一旦長出新葉，即可施以薄肥，但必須留置於苗床上1年，到翌年早春方能進行移植。

選購方法

由於緬梔的花都開在枝梢，所以，選購時，必須以分枝多的植株，作為優先考慮，因為分枝多方能有較多的花序產生。

開花後處理

花後(12月)宜進行修剪，尤其是盆栽，必須矮化植株，所以，於花後應剪去部分枝條；然而，庭園樹則例外，以其自然的樹型姿態較美。 ■



團體供膳

盤餐菜單設計

輔仁大學 黃韶顏·蔡蘭芳編著

本書適用於便當公司、自助餐、營養午餐等經理、菜單設計人員、庫房管理人員、採購人員及廚師，每套菜單份量為100人份，由此可作預算控制、採購、庫管、烹調之參考。每本定價500元(精) 郵購每次另加掛號郵資45元。

豐年社

台北市溫州街14號 電話：3628148
郵政劃撥0005930-0 豐年社

花卉、果樹、蔬菜增產用

- 進口高級安全系列肥料
- 各種藥劑
- 設施園藝用
- 各種批發材料

歡迎商洽

台和園藝企業股份有限公司

TAIWAN HORTICULTURAL CO., LTD.

台北市士林區中正路104巷1弄2號

電話：(02)881-3334 郵政劃撥：0101360-9

■每星期六、日建國花市本公司設有服務攤位



黃花緬梔花冠特寫



橙紅色的緬梔，本省栽培較少。



緬梔花具芳香，可供作香料。



緬梔花頂生，是初夏開花最明媚的樹木之一。

新書預約・特價優待

使你的花兒更美麗・更有價值！

花卉害蟲防治第一本專書

花卉害蟲彩色圖說

——王清玲博士著——

定價：470 元

預約優待價 376 元

(即日起至80年4月30日止)

- 主要内容 / 包括：一、昆蟲及花卉蟲害問題(昆蟲的外形、昆蟲的發育及繁殖、昆蟲的重要習性及其對環境的反應、花卉害蟲問題的特性)，二、花卉害蟲防治(耕作管理的配合、利用誘引或忌避物質、土壤處理、生物防治、藥劑防治)，三、花卉害蟲及有害動物(花卉害蟲類別簡易區分法、害蟲種類介紹)，四、花圃中常見的有益昆蟲，五、常見花卉上害蟲名稱，六、殺蟲劑中英名稱對照表及索引等。
- 全書16開豪華彩色精印，166頁，彩色照片230餘張。
- 預定80年5月1日出版，定價470元，即日起至4月30日止匯款預約者僅收376元(郵購另加掛號郵資45元)

豐年社

郵政劃撥0005930-0豐年社
台北市温州街14號
電話(02)3628148
傳真(02)3636724