

涼棚植物 鐵線蓮

文／禾薈



夏天是鐵線蓮的盛花期。(禾薈 攝)

鐵線蓮屬於毛茛科，為多年生的草本蔓性植物，原產於以中國為中心的石灰岩地帶，亦即多雨的溫帶地區，主要分佈的地方有中國大陸、日本、印度、南歐等地，全世界大概有300多個原生種，而在日本就有30多種，也難怪日本人對鐵線蓮會那麼的熱衷與喜愛。原來他們早已佔了先天之利，亟力推廣，目前在日本已有地方性的“鐵線蓮協會”成立，而每年也都有新品種被育出。

我們先來談談其芳名的由來。從植

株性狀上的觀察，因其蔓性莖呈棕褐色，又暗又硬，有如鐵線一般，加上其花形像蓮花，所以，取名為“鐵線蓮”。而國人自古以來，只要是外來的東西，都認為是“番邦”之物，所以，將它稱之為“番蓮”。

此外，再來看看它的花，有人說它像蓮花，有人則說它像風車，所以，除了稱為鐵線蓮、番蓮外，日本人則索性叫它作“風車”。這一大堆的名字，一一都顯示出人們對它的觀察入微及喜愛，不是嗎？

鐵線蓮的屬名 *Clematis*，乃由西
臘語 *Klema*（卷鬚、蔓之意）而來的，
因為鐵線蓮具有卷鬚且能攀爬，所以，
也有人稱它為卷鬚蓮。

鐵線蓮為多年生落葉性的蔓性藤本
植物，有時則呈灌木狀。它的蔓性枝莖
種植多年後，常呈木質化，而枝莖的長
度則可攀爬數公尺至十餘公尺。葉為羽
狀複葉，小葉3枚，呈卵狀倒披針形，
全緣或有缺刻，因品種之不同而差異甚
大。

鐵線蓮全年可開花，但以夏季開花
最盛，花姿雅逸而美觀，花形或單瓣或
半重瓣或重瓣，呈輪狀的排列於花托上。
花瓣因品種之不同，形狀也各有差異，
有呈橢圓的、披針的、卵形的、卷鬚
的……等，或展開、或抱合，真是奇妙
極了！而其花蕊也頗為出色，雄蕊、雌
蕊數目均多，集中於花的中央，有的顏
色柔和，有的則顏色強烈，與花瓣顏色
恰成強烈的對比。花後可結帶有長尾毛
的蒴果，其美妙的果實形態，亦頗具有
可看性。

鐵線蓮的花色繁多，計有藍、淺藍
、深藍、紫、淺紫、深紫、黃、粉紅、
白、乳白、桃紅…等，也有帶有放射斑
紋的雙色花品種，應有盡有，不管是盆
栽或綠籬、陰棚栽培，都非常具有可看
性。

栽培管理要訣

•日照：以半日照的環境最適合，
忌強烈的日光直射，所以，栽培時最好
栽培於房子靠南邊的地方。

•溫度：鐵線蓮較喜歡冷涼的氣候
，所以，在本省夏天較不容易越夏。生
育適溫約20~25℃，發根適溫則約20℃
。有些品種冬天太冷時，地上部會產生
落葉，甚至枯萎；但一到了春天，則重
新萌發新芽。

•土壤：以排水良好且富含有機質
的砂質壤土為最佳。

•澆水：忌高溫且多濕的環境，所
以，盆土不可過濕，每次澆水必須等盆
土完全乾燥後再重新大量澆水。而夏季
天氣炎熱最好能夠每天澆水，且栽培處



鐵線蓮綠籬。(小木偶 攝)

必須保持通風，否則葉片、花朵容易被
悶壞。所以，寧願稍為乾燥也無妨。

•施肥：鐵線蓮較喜好天然的堆肥
或腐熟有機肥，若使用三要素則必須氮
、磷、鉀都要平均使用，每年大概分為
4次使用，2月、5月、9月、12月各
施用1次即可，尤其是四季開花的品種
，肥料一定要施用均勻，否則較不易產
生花蕾。

•繁殖：可用種子播種、扦插、嫁
接或分株法繁殖均可。種子播種及扦插
、分株通常都於春天（2~3月）施行
較適宜，因為此時的溫度最適合發根。
當年採的種子，最好能留到翌年春天再
播種，如此可提高發芽率。

開花後處理

開花後，植株應做適度的修剪，以
利於萌發側芽，產生更多的花蕾，增加
開花數。 ■

學名：*Clematis hybrida* Hort

英名：*Clematis*，Virgins Bower

日名：ワレマチス、テツセン、カザ
グルマ

別名：鐵線、番蓮、卷鬚蓮、風車

科別：毛茛科

原產地：中國大陸、印度、日本等地

觀賞期：全年、夏季為盛開期。

用途：切花、盆栽、庭園中綠籬或陰
棚栽培。