
山茶芳姿(林果攝)



茶花為多年生的喬木或灌木。 全世界大約有二、三百個原生 種,大多分佈於熱帶及亞熱帶,我國則 佔有 200 種以上,盛產於長江流域及西 南各地。

山茶花的葉單葉, 互生, 無托葉, 葉面油綠,厚而具光澤。花常兩性幅射 對稱,多單生,萼片和花瓣各5枚。花 的顏色,紅、白、黄、紫均有。可結鞘 果,果實含脂肪較多,可供榨油。

栽培與管理要訣

• 日照:山茶花喜歡半日照的環境 。 夏季的盆栽, 需加遮光網遮陰, 以避

免烈日猛晒後,產生葉燒病。而冬季, 則需將盆栽移到向陽之處,接受較充足 的日照。

· 温度:性喜較温暖的環境,生育 適温約15~25℃。冬天應防寒害,除了 移至室外接受日照外,寒流來襲時,夜 間更需加以保温或移至室內;但不可久 置室內,因室內通風較差,會引起葉黃 脱落,花苞枯萎,嚴重影响生長和開花。

• 土壤:山茶花對土壤有一定的要 求,一般以疏鬆肥沃且偏酸性(PH值 在5~6.5之間)的土壤較佳,亦卽紅 褐色的山土;切忌使用碱性或粘性較重 的土壤。此外,若是盆栽,應選用陶盆

第33頁答案 :雞冠花

,因為陶盆吸水性和透氣性較強,較適 合根群的生長,特別是幼苗期。

• 澆水:除了保持應有的濕度外, 忌積水。此外,應注意水質,若是長期 使用碱水澆灌,山茶將長得不好,甚至 死亡;所以,最好以雨水澆灌。

· 施肥: 合理的施肥,是養好山茶 花的重要一環。當4月花謝之後,應立 即施加追肥(氮肥為主)數次,每10~ 15天一次,以促進新的枝葉生長。5月 起,新枝已逐漸呈現木質化,此時也正 是山茶花開始育蕾的時候,此時應施以 磷鉀肥為主的肥料2~3次(每15天~ 20天一次),促進育蕾。到了8月前後 ,山茶花的枝頭上就會出現一個個像黃 豆般大小的花蕾。

•繁殖:一般多採用扦插或高壓法 。可在梅雨季節中進行。扦插時,可將 插穗(带一葉一芽的莖即可)沾上發根 劑後再扦插、壓實,澆足水並稍加遮陰 ,可提高發根率,插後一年方可移植。 高壓法在家庭栽培時被普遍使用,成活 率較高。種子播種亦可,但需4~5年 方可開花,故較少被採用。

山茶花的利用

山茶花不僅有很高的觀賞價值,且 有極高的經濟價值,全身是實,用處頗 多:花朵和樹根可以入葯,葉子可作飲 料,種子可榨油,食用營養豐富,木材 結構緊密、堅硬,是雕刻的好材料。

1.食用:花於含苞待放或初開時採 收,晒乾或烘乾備用;也可鮮用,製作



艷紅的茶梅

茶花果醬。習慣上以紅花種為佳。

2. 葯用:收斂凉血、止血、謂胃、 理氣。

①治療火傷:山茶花研末,用麻油 調勻後數用。<本草綱目>

②治大便出血:山茶花研末,每服 3~6克,亦可用山茶花或葉片以開水 沖泡後代茶飲用。

③治吐血、便血、血崩:山茶花6 ~9克,水煎代茶喝。

④治赤痢:大紅寶珠山茶花,晒乾 研末,加白糖拌匀,以電鍋蒸後服用。 〈本草綱目拾遺〉

⑤治跌打損傷:山茶花根15~20克 (鮮品量應増加),水煎,調黄酒後服 用。

⑥治痛疽:山茶花鮮花適量,洗淨

小廣告

- 每行14字收費100元10行爲限 ■
- ●來稿與廣告費,請在出版日期15天 前一併寄到。
- 廣告費請利用郵撥0005930-0號 豐年社。廣告稿寫在劃撥單的通訊 欄內。

登本刊小廣告 費用少效果好

農業蔬菜花木 育苗軟盆 降低成本專用 專業工廠 033-375881 06-6328339 尺寸齊全 郵撥03590449 宗慶塑膠股份有 限公司△徵縣市經銷商洽陳文祥