

輸日芒果病蟲害防治用農藥參考基準

一、台日雙方皆訂有殘留容許量且我方標準與日方相等或較嚴之藥劑種類

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
白粉病	貝芬依滅列	2 2	2 1	6 6	貝芬替 依滅列
	芬瑞莫	1.0	0.5	6	
	無水硫酸銅				免訂
	鋅錳邁克尼	2 1.0	2 0.5	18	二硫代 邁克尼
	賽普待克利	5 1	1 0.5	6	賽普洛 待克利
炭疽病	三氟敏	5	1	18	
	甲基鋅乃浦	2	2	30	二硫代
	克收欣	5	1	6	
	免得爛	2	2	21	二硫代
	扶吉胺	0.5	0.5	6	
	貝芬撲克拉	2 2	2 1	6	貝芬替 撲克拉
	貝芬錳	2 2	2 2	6	貝芬替 二硫代
	亞托敏	2	1	12	
	待克利	1	0.5	6	
	撲克拉錳	2 2	1 2	6	撲克拉 二硫代
	鋅錳乃浦	2	2	15 (SC) 30 (WP)	二硫代
	鋅錳邁克尼	2 1.0	2 0.5	18	二硫代 邁克尼
	錳乃浦	2	2	30	二硫代
黑斑病	三元硫酸銅			3	免訂
蒂腐病	枯草桿菌				免訂
介殼蟲	滅大松	0.2	0.1	18	
	礦物油				免訂
	夏油 甲				免訂
木蝨	納乃得	3	2	8	
東方果實蠅	芬殺松	5	1	12	
葉蟬	加保利	3	0.5	15	
	可尼丁	1	0.5	6	
	矽護芬	5	2	9	
	納乃得	3	2	8	
	賽速安	1	0.2	6	
	益達胺	1	0.5	6	
	加保利	3	0.5	15	
夜蛾（螟蛾）	芬殺松	5	1	10	
	嘉磷塞異丙胺鹽	0.2	0.2		
雜草	嘉磷塞異丙胺鹽	0.2	0.2		

二、台日雙方皆訂有殘留容許量，但日方標準較我方略嚴之藥劑種類 (差異值較小者)

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
白粉病	菲克利腐絕	0.5 3	0.5 5	12 12	菲克利 腐絕
炭疽病	克熱淨	0.3	0.5	6	
	得克利	1	2	6	
	腐絕快得寧	3 2	5 2	12 10	腐絕 快得寧
黑斑病	歐索林酸	0.5	1	15	
葉蟬	加保扶	0.3	0.5	9	
	布芬淨	0.5	1	6	
	布芬第滅寧	0.5 0.5	1 0.2	9 20	布芬淨 第滅寧
	亞滅培	1	2	6	
	派滅淨	0.1	0.2	9	
	畢芬寧	0.5	1	6	
	撲芬松	0.8 1.0	1 1	10	撲滅松 芬化利
	賽洛寧	0.5	1		
	撲滅松	0.8 1.0	1 1		撲滅松 芬化利

三、日方殘留容許量較我方嚴苛者 (※欲生產輸日芒果者應避免使用)

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
抑制徒長	巴克素	0.01	0.5		
白粉病	三泰芬	0.05	0.5	6	
	三泰隆	0.05	0.5	6	
	平克座	0.05	0.5	6	
	普克利	0.05	1	6	
	四克利	*	0.5	3	
	布瑞莫	*	2	12	
	依瑞莫	*	2	10	
	溴克座	*	0.5	6	
炭疽病	腓硫醃	0.5	3	6	
	貝芬四克利	2 *	2 0.5	6	貝芬替 四克利
	滅特座	*	0.5	12	
	嘉賜貝芬	* 2	0.5 2	6	嘉賜黴素 貝芬替
	賽普護汰寧	5 *	1 2	9	賽普洛 護汰寧
黑斑病	嘉賜快得寧	* 2	0.5 2	6	嘉賜黴素 快得寧
	嘉賜銅	*	0.5 免訂	6	嘉賜黴素 鹼性氮氧化銅
	護粒丹	* *	0.5 2	6	護粒松 熱必斯
葉蟬	貝他-賽扶寧	0.02	0.5	6	
	達馬松	0.01	0.2	20	
	護賽寧	0.05	1	15	
	加護賽滅寧	* 0.03	0.5 0.5	15	加護松 賽滅寧
	布芬益化利	0.5 *	1 1	9	布芬淨 益化利
	免敵克	*	0.5	20	
	亞滅寧	*	2	9	
	加保福化利	3 *	0.5 1	6	加保扶 福化利
薊馬	丁基加保扶	0.2	2	21	