

加強防範稻縱捲葉蟲

此值二期作期間，由於中南部及東部的水稻主要產區陸續發生稻縱捲葉蟲危害，為避免該蟲大發生，影響水稻生長，請農友把握防治適期加強防治。稻縱捲葉蟲又稱瘤野螟，二期作水稻的分蘗期該蟲即陸續出現，而孕穗末期至抽穗期間為其發生盛期，發生密度高時幾乎整株葉片均會被害，造成白葉滿田，影響甚巨。

以下防治要領，將可有效減輕瘤野螟為害：(一)清除田邊雜草：田邊溝渠或山邊雜草容易成為瘤野螟在水稻繁茂前的棲息場所，清除稻田周圍雜草可減少害蟲來源。(二)合理施用氮肥：因成蟲具有趨綠性，過量施用氮肥會造成稻株生長特別嫩綠茂密，易吸引瘤野螟的族群聚集為害。(三)藥劑防治：在二期作水稻分蘗期

及孕穗末期，稻田周圍具茂密之雜草且避風之田區更應特別注意。成蟲發生盛期後7天可施用10%得芬諾可濕性粉劑1,000倍或75%歐殺松可溶性粉劑1,500倍或2.8%賽洛寧乳劑2,000倍一次。其他使用之藥劑可參《植物保護手冊》選用。🌱



瘤野螟危害水稻植株情形

為害楊桃主幹與枝幹之害蟲

斑星天牛	參考防治花姬捲葉蛾之藥劑	1.成蟲出現時期(5-7月)，於防治花姬捲葉蛾時，可一併防除。 2.藥劑施用於距地面1公尺以下之主幹，以防止雌蟲產卵。	1.利用物理法阻隔雌蟲產卵，如主幹上塗以石灰乳劑、黏蟲膠或包裹塑膠布等。
咖啡木蠹	參考防治花姬捲葉蛾之藥劑	1.防治花姬捲葉蛾時，可一併防除。 2.藥劑防治時機為4-5月、9-10月。	1.摘除卵塊。 2.剪除被害枝條。

註一：石灰乳劑配方：生石灰一公斤，砒酸鉛、食鹽及豬油各150公克，水18公斤混合而成。

註二：性費洛蒙資材洽農委會農業藥物毒物試驗所(04-23302101)、生物防治天敵資材洽苗栗區農業改良場(037-222111)及中興大學昆蟲系施劍瑩教授(04-22840799)