

作好**褐飛蝨**及**瘤野螟**防治

——期水稻晚植稻正進入抽穗中期，早植稻已值糊熟期，田間已有零星褐飛蝨及瘤野螟發生，台南農改場請農友提早作好防治工作，以避免造成損失。如果防治不當導致大量減產，將後會莫及。

水稻褐飛蝨年發生8-10世代，常於二期稻作乳熟期至糊熟期間為害最烈。褐飛蝨卵產於葉鞘基部組織內，成蟲及若蟲均好群集於稻株接近水面之葉鞘基部，吸取稻液為害，受害輕者基葉黃化，重者全株枯萎造成「蝨燒」。瘤野螟卵產於葉片，剛孵化之幼蟲可危害嫩葉葉肉，二齡後即將葉尖捲成筒狀，並藏匿其中，沿葉脈取食，呈長條白色斑紋食痕。成蟲有趨嫩綠性，植株生長特別嫩綠繁茂之稻田，瘤野螟產卵量較多，被害亦較嚴重。

偏施氮肥造成稻株生長過密及特別嫩綠，均有利於瘤野螟及褐飛蝨的繁殖與危害，遵守合理化施肥可減少病蟲害的發生與蔓延。防治適期為水稻孕穗期褐飛蝨密度平均每叢達5隻左右時施藥一次，當密度再升高至每叢10隻以上時需再行第二次施藥，藥劑可使用16%可尼丁水溶性粒劑3,000倍、10%賽速安水溶性粒劑4,000倍、9.6%益達胺溶液3000倍或25%布芬淨可濕性粉劑1500倍或11.78%布芬第滅寧乳劑1,000倍或15%布得芬諾可濕性粉劑1,000倍或25%派滅淨可濕性粉劑1,500倍。若同時發現瘤野螟危害時，使用11.78%布芬第滅寧乳劑1,000倍或15%布得芬諾可濕性粉劑1,000倍防除。或參考施用《植物保護手冊》登記之防治藥劑，但請農友必須遵守安全採收期。🌱



**播田有希望
犁草是多工
割稻收成有好糖**

**豐年甲大家交心超過50冬囉！
恁的辛苦 阮攞知
恁若遇到農業上的問題 老朋友來道幫忙
電話、傳真、e-mail嘛也通**

豐年社
關懷農業專線：
02-23628148 #27
傳真：02-23636724
e-mail：h3628148@ms15.hinet.net