

～11月羽化，體長20～37公厘，前翅上散佈藍黑胡麻斑點。成蟲產卵在葉柄或枝條表面隙縫間或樹幹上。卵孵化後，初齡幼蟲僅能於幼嫩枝條中或其葉芽內取食，爾後鑽入較細枝條中，老熟幼蟲鑽入較大枝條或枝幹，沿木質部周圍蛀食，造成一橫斷環食而使水份不能上昇，致使環痕以上部份逐漸枯萎，輕微

時常見枝條、葉子乾枯現象，嚴重可致樹木枯死，老熟幼蟲化蛹於枝幹內。

■防治方法

1. 燈光誘殺：夜間懸掛黑光燈誘殺，降低其族群密度。
2. 發現乾枯枝葉立即剪除、燒燬。
3. 成蟲出現盛期(4～6月)，可結合荔枝蒂蛀蟲進行防治。



旅遊小站

別有風味的「好所在」

文圖／天姿

「健腳」挑戰百岳的風氣方興未艾，現在又有「台灣百名山」的推薦，更顯「寶島」的風景光彩。

當然，體質稍弱者，除了羨慕，只好望山興嘆，有心無力。不過，懂得「山不在高，有仙則名」的道理，即使一座小山頭，若認真注意，也會發現「好所在」。

位在台北市大直與雙溪之間的文間山，海拔雖僅184公尺，無特異的山形，且在山下無法辦明，但山頂上草木繁茂，一旦進入，卻是別有天地。

其西北是著名的故宮博物院，東南山麓有古刹劍潭寺，西乃自強隧道，東西鞍部為舊時的大直、外雙溪越嶺山



徑，路跡明顯。

