


自然抗「煞」

文圖 / 天姿

「綠」綢衫繡上紅牡丹——美麗的大自然景觀，散發芬多精；雖然醫學文獻上沒證明「芬多精」可抑制嚴重急性呼吸道症候群的蔓延，但是綠精靈能增強免疫力，提升防SARS的功效應是肯定的。

抗「煞」用什麼劑方？在何方？投入大自然懷抱吧，你即會有所領悟！🐾



萬綠叢中一片紅是
——自然抗「煞」方

一 答：番石榴立枯病為系統性病害，病原菌只能經傷口侵害植株，引起落果而枝條枯萎，病勢慢慢擴及全株，使植株死亡。其傳播途徑為死亡組織上表皮裂開，產生淡紅色粉狀物，內有分生孢子，藉此傳播。目前本病尚未推薦任何防治藥劑，請參考下列防治方法：(一)病株處理：發現病枝時，由分支處予以鋸除，並隨即塗上柏油或油漆。鋸除之病枝及落葉，應收集燒毀。鋸除工具應用酒精消毒。(二)補植時，應挖除原株附近舊土壤換用新土壤後，再行種植。(三)廢耕：發病株達30%以上時，即行廢耕，植株挖除就地燒毀，果園改種其他作物。(四)土壤消毒方法：罹病土壤施尿素後澆水，再用塑膠布覆蓋二週，可殺死土壤病菌。

問：請政府協助番石榴開拓國外外銷市場。

答：為解決國內市場飽和現象，番石榴必須開拓國外市場。為符合外銷需求，本省番石榴生產需朝提高果實品質及確實作好分級包裝工作。開拓外銷市場需調查國外番石榴品種需求，喜好之特性及風味，有外銷潛力之市場及國家。政府編列預算赴國外舉辦農產品宣傳及促銷會。

問：幼果發生日燒及果實黑褐現象時，如何防治？

答：幼果套袋後，果實發生黑褐色斑點現象，據初步判斷推測可能為下列原因：(一)高溫障礙引起；(二)果實套袋後在日間因袋內溫度過高容易發生藥害，尤其是廿世紀品種容易發生。台中場植保專家表示：果實發生黑褐色現象據初步判斷應屬瘡痂病或炭疽病所引起的，今後田間如發現略似狀況，請來電聯絡台中場派員前往鑑定。🐾