

避免清耕造成土壤裸露。旱季期間可使用機械除草，減少雜草消耗土壤水分，冬季低溫，地被植物生長緩慢，可放任自然生長，春季果樹生長旺盛，宜減少園區內地被植物之競爭。

三. 結論

任何雜草防除的措施，均會降低不同程度的危害，若針對特定種類雜草的完全根除，不僅困難度高且所需成本驚人。目前台灣農民大部分倚賴除草劑防治雜草，而忽略了如何配合其他非藥劑的防治技術，尤其是降低

雜草種子入侵與散布的預防性措施。以農地永續利用為目標之雜草管理，須兼顧生產效益與環境保護原則，尤其在除草劑長期使用、耕作方式大幅改變，高危害性外來植

物入侵之衝擊下，必須深入探討雜草在農業生態系中的角色變化，及除草劑以外之其他替代或輔助技術發展之可行性。雜草合理化管理策略，應著重在以監測及危害界限為防治實施之依據，推動雜

草非根除的觀念，及綜合運用各種防除技術較易達到永續經營的成效。豐



草生栽培之甜柿園

台南地區 洋香瓜病毒疫情升高，請農民加強防治

資料來源 | 動植物防疫檢疫局

台南地區所栽培之洋香瓜，近來發現瓜類病毒病害疫情有升高趨勢，且經由粉蝨、薊馬及蚜蟲等媒介昆蟲傳播，防檢局籲請農民注意栽培管理及清園工作，加強防治媒介昆蟲，以避免疫情擴大。

防檢局表示，目前於部分地區連作瓜田也發現有黑點根腐病之危害，為預防該病發生，請農友應避免連作，必要時於植株生長初期至結果初期，可使用50% 脫克松可濕性粉劑稀釋 1,000 倍做根部灌注，以保護植株。農友如有病蟲害防治問題，可逕上防檢局農藥資訊服



粉蝨為傳播洋香瓜病毒之媒介昆蟲之一

罹病洋香瓜葉出現捲葉的病徵

務網 (<http://pesticide.baphiq.gov.tw/>) 查詢，或參考《植物保護》手冊用藥，並應遵守藥劑使用規定。亦可就近前往農委會所屬試驗改良場所請求協助診斷與指導，或透過植物病蟲害診斷服務專線：0800-069-880，洽詢各地診斷服務站的專家。豐