

農業

災後重建專題

洋香瓜災後復耕

1. 8 月上旬非洋香瓜隧道式栽培的推薦季節，農民若搶早種植因而遭遇風害、降雨與淹水，造成植株萎凋乾枯，隧道棚毀損時，須待田間積水消退進行全面清園，全面以殺菌劑消毒以維持環境衛生，待天候好轉時，重新整理隧道棚使其恢復完整。若是原受損者為幼株，則畦面仍完整，需待原受損植株根系自然分解後再於原植穴栽種，不可操之過急。

2. 為避免殘存之病原菌孳生危害新植幼苗，可於定植後進行土壤殺菌劑灌注或是加強有益微生物菌之施用，幫助新植幼株順利成長。若是原受損株已是開花～小果期之成株，復耕之新株則不宜於原植穴種植，改於原 2 穴中間新鑿植穴、若是原受損株已是中果期～成熟期者，為避免連作，復耕則不建議再種洋香瓜，最好將園區重新整理，改種其他非瓜類的作物。

3. 若是塑膠布溫室中所種植之直

立式洋香瓜，由於設施保護效果較佳，植株受損情形常較輕微。若是雨水由基地四面灌入，須儘速加強排水或是以抽水機抽出積水。颱風過後因天氣常偶雨及陰天，使得濕度極高，須加強內循環風扇之運轉，將四周捲簾拉高加強通風與換氣，使植株的蒸散作用能順利進行。溼度高使露菌病、白粉病、疫病、蔓枯病發生的機會增加，須注意加強防治。

4. 颱風來襲適逢開花期則雌花難著果，預留的結果枝常成無效蔓，適時葉面施用較高磷鉀比例的複合即溶肥，促進較高節位留果蔓上的雌花能著果，減少無果株。受損葉片與例行之整枝理蔓須於天放晴時進行較佳，可減少傷口感染。中果期～成熟期之植株，亦可藉葉面施用較高磷鉀比例的即溶肥，使植株可儘速恢復生長勢並維持果實品質。豐

農業

災後重建專題

芒果災後復耕

1. 積水地區應先排除積水。

2. 將全園予以適度修剪，尤以折枝部分，同時清園，包含落枝落果等，再予以噴灑藥劑防治。

3. 倒伏植株，切勿勉強扶正，以免 2 次傷害。應先予以適度的修剪、果實摘

除，以防止水分散失，並於傷口塗抹藥劑保護，立支柱固定，視其生長勢回復後，再適度的扶正。扶正時應在不傷害根系為原則。

4. 大量土石流沖刷者，應修復並設置擋土牆及開立排水溝，並種植適當草種以防水土沖刷。豐