

都市花農 備忘錄

撰文／小木偶

月初仍為“處暑”，民間有所謂“處暑處暑，熱殺老鼠”的說法，可見此時天氣仍十分炎熱；但待“白露”降臨時，溫度就會漸漸下降。所謂“白露”，即過了白露之後，陰氣漸漸重了，清晨的露水一天天多了，凝結成一團團白色水珠，故稱之“白露”。在大陸北方，此時鴻雁便集體南飛覓食，當它們整齊的排列成“人”字形或“一”字形飛過時，彷彿也在告訴人們入秋了天涼了。“白露”之後的“秋分”，分即半，這天秋季剛好過了一半，此時草木逐漸凋零，鳥獸昆虫等也準備進入冬眠。然而，在四季如春的寶島，要見到如此分明的景象也不容易，以農曆八月最富代表的桂花為例，在大陸由於氣候分明，因此桂花須待八月才會盛開；而在台灣幾乎大半年的時間均可看到聞到桂花飄香的景緻及芬郁的氣味。

草花播種

過了炎夏，溫度較為和緩，得天厚愛的台灣又進入了另一個生長旺期，尤其是許多漂亮的草花喜愛冷涼的氣候，台灣的秋冬季對它們而言最為合



秋播草花——萬壽菊(夢漾 攝)

適，在初秋播種，就可擁有一個燦爛繽紛的冬季了！當然你也得先將夏季花後逐漸凋萎的花槽先行整理一番，將其清除，並添加新土及基肥，再植入新苗。秋播的草花有矮牽牛、金蓮花、石竹、萬壽菊、孔雀菊、美女櫻、一串紅、波斯菊等，可採同種同色或同種不同色播於同一花槽，效果均佳，且較易管理；同一花槽中最好不要栽培不同種的花卉，增加管理的不便！

花木移植

夏季生長較弱的植物，如玫瑰、四季海棠、蟹爪蘭等，此時必有不少殘枝敗葉，應予剪除，使其萌發新芽；促進花芽的產生。蘭花亦可於此時進行換盆的作業；但正值花期的蘭花如秋石斛，則待花後再行更換介質。換盆的同時亦可進行分株，分株時注意使用器具須鋒利，傷口才會整齊；將切

割後的植株傷口陰乾後可再行種植。庭園木類此時可行移植，如茶花、梔子等常綠闊葉樹種，若再晚些移植，則會影響其根部的生長；盆景類中的常綠樹種如羅漢松、黑松、七里香等，亦可於此時換盆；而將進入休眠的落葉樹種如楓、槭等則不適於此時換盆，生長易受破壞不易恢復。

繁殖最宜

此時為繁殖盛期，觀葉或觀花植物此時均可進行扦插、分株或壓條等繁殖工作，存活率極高。一般維護上須注意施肥工作的進行，使植物在這一時期吸收足夠的養分，以備越冬時所需。施肥時須注意“少量多次”的原則，可每2週施用一次，但濃度不宜過高，以免造成肥傷。觀葉植物施用氮肥較重的肥料，即將開花的植物則施用含磷、鉀肥較重的植物以促進開花、結果。