

為大地著色

寶島的鄉土樹各展神通，
以繁花、果實與耀眼的紅葉
為大地獻上最豪華的冬衣。



大 地的色彩純淨自然，而植物却在其上發揮多彩多姿的色彩效果。有些植物甚至由年初到年尾，經常地變換色彩，展現令人驚異的外貌。年尾的12月，更是許多植物為大地著色的月份，他們抖落了原有的衣粧，巧心慧手地更換新裝扮。因此，在初冬之際，北風吹起涼意漸濃，當你漫步田野、村落或登山尋幽訪勝之際，不妨多以欣賞的眼神，仔細瞧瞧周遭的植物，看看大地如何上了彩裝。

在12月間，許多植物不畏初冬，綻放滿樹的花兒在枝頭，如大頭茶、鳳凰山茶、山茶、茶梅、梅、艷紫荆、洋紫荆、山批杷、樹蘭、朝日蔓聖誕紅、美人樹…等。另有一些植物則是在春～秋間開花，直至年尾才結出觀賞性的果實，如羅氏塩膚木、台灣欒樹、鵝掌藤、火筒樹、台灣海桐、春不老、狀元紅、火刺木…等，不論紅、黃、橙、紫，都是顯眼而壯觀。還有一群落葉喬木，在落葉前，葉內的葉綠素逐漸

被破壞而減量，體內的葉黃素却轉變成花青素，紅色的花青素大大地超過了葉綠素，葉色就由綠變紅了！台灣也有不少此種變葉植物，如：青楓、楓香、台灣掌葉槭、無患子、台灣三角楓、台灣紅榨槭、欒仁、銀杏、台灣欒樹、黃連木、山柏…種類實在不少呢！

限於篇幅，只能略加介紹其中部份，首先是一些12月開花的觀賞植物：

花的禮贊

●聖誕紅(*Euphorbia pulcherrima*)

英名叫 Poinsettia 的大戟科灌木，11月下旬就可在本省各地見其艷紅的花苞展放，雖原產於墨西哥，一進入台灣後，適應狀況極佳，庭園處處可見，在花市中也是冬季主要盆花之一。

它是有名的短日照植物，當日照漸短，每天僅接受12小時以下之光照，它才會產生花芽分化，開出碩大的花朵。如果你在其它季節（如夏、秋）看到聖誕紅的盆栽開花，也無須訝異，因為它在人工黑布遮光下（每天在黑暗中度過12小時以上），經過4、50天，就可形成花苞。只要控制得當，幾乎可以全年提供開花的盆栽。

繁殖非常容易，一般均以扦插法，成活率非常高，繁殖適期在4～8月。但若喜歡植株矮小即開花，則最好在7～8月時才採取健康的頂芽插穗，約10公分長，予以扦插，約2星期左右就會生根了。

這家喻戶曉的植物，也是在12月份開始，點綴家園、居室少不了的植物。



聖誕花泛紅時，年尾的脚步近了。

●大頭茶(*Gordonia axillaris*)

為常綠小喬木，分佈於本省低、中海拔地區，有著筆直灰褐的樹幹。葉呈長橢圓形，革質頗具硬感，葉面光滑濃綠，全緣葉僅於葉端有少許、甚至不明顯的疏鈍鋸齒。12月開出碩大的白花，冠徑5～6公分或偶有更大者，5瓣，瓣緣縮波浪狀。4～5月結出木質褐色的蒴果，成熟時會開裂，要採種可得趁早，免得種子隨翅飄飛而去，僅留一中軸。

大頭茶宜在向陽之肥沃地栽育，生長速率中等，生性強健，可用播種或扦插來繁殖。



12月開花的大頭茶

●洋紫荊(*Bauhinia purpurea*)

落葉性小喬木，株高在5公尺上下，每年4月落葉，但也很快萌芽發生新葉，光禿期極短或不明顯；花則綻放於11～1月間，12月常是其盛花期。花亦具芳香，但與艷紫荊不同者是花色淺紫粉色，色彩淡淺很多，葉片也比較小型，葉面徑約7～10公分而已，葉身常呈摺合下垂狀，葉端凹裂為二，裂端較銳。

此種現栽培於本省中、南部頗多，適應力強，無病蟲害，但觀賞性略遜於艷紫荊。




洋紫荊在12月間盛花滿樹

●艷紫荊(*Bauhinia × blakeana*)

此為蘇木科的常綠喬木，株高約10公尺，馬蹄型的葉片，葉面碩大，徑約15～20公分，葉色略呈藍綠色。花序徑約15公分，相當可觀，為頂生的總狀或繖房花序，有香味，一年四季常開，葉片又不見光禿，花色紫玫瑰紅，盛花期間醒目耀眼。

在台灣平地由北至南均見栽培，而且都生長得很好，少見病蟲害，是相當值得推廣的觀賞植物。



艷紫荊盛花時，如盛粧的靚婦。

● 梅 (*Prunus mume*)

薔薇科的落葉小喬木，株高在10公尺以下，樹幹常呈彎曲狀，幹面易附生許多苔蘚地衣類。卵形葉，葉端有一長尖尾，12月間，葉片已脫落殆盡，枝頭掛滿了雪白的花兒，花冠徑約1.5～3公分，5圓形花瓣，花朵釋放出淡淡的芳香。翌年5～6月，果熟，可採摘醃食。



12月梅花盛開了

● 美人樹 (*Chorisia speciosa*)

木棉科的落葉大喬木，樹如其名，是相當有特色的熱帶花木。幹基肥大，綠幹上有許多尖錐狀的銳刺，第一側枝輪生性橫向伸展，掌狀複葉。10月開始有花出現，12月份仍在盛開著，花朵碩大，花冠徑達10公分，有5個花瓣，花色玫瑰紅紫，花朵中心白並有紫紅斑點，花色鮮麗美艷。

春天結果，果實大如拳頭，成熟開裂後，露出黑色密被白綿毛的種子，可播種繁殖，發芽率極高，可自行採種一試；另亦可用扦插法繁殖，並可提早開花。

果的沈思

某些在春、夏間開花的植物，12月也是它們載滿盈盈果實的豐收季節，色彩漂亮的果實為大地生色不少。

● 鵝掌藤 (*Schefflera arboricola*)

本地低海拔至高海拔地區均有分佈，生性極為強健，對環境適應彈性大，耐旱又耐濕，全日照或陰敞暗處均有見其生長。掌狀複葉，小葉7～9枚，9～10月間開花，花淡綠色，不甚顯眼。12月結果盛期，果粒小，果徑雖僅0.5公分，但果數繁多而壯觀，黃橙橙的果色染黃了藍天。

鵝掌藤適全省各處栽培，照顧管理相當容易，可以修剪方式促其矮化，植株呈高腳狀時亦可予以強剪。一般均以扦插法繁殖。



盛花的美人樹，只見紅花不見綠葉。



鵝掌藤為數衆多的亮麗小果

葉的舞蹈

●台灣海桐 (*Pittosporum pentandrum*)

本地產的常綠小喬木，株高約2~4公尺，革質、互生的單葉，葉呈長橢圓形，葉長5~8公分，寬僅1~2公分，全緣。開白花，有芳香，5~10月陸續開放，12月時樹上掛出聚集成團的桔黃色、圓球形的小蒴果，果徑雖小但顏色亮麗，觀果價值頗高。

此種陽性樹，生長快速，耐性十足，亦可種在海濱，耐風、耐鹽，適種於本省由北至南，由平地至海濱各地。

庭園中現亦見此樹被修剪成灌木狀，或裁成連續性綠籬，既可觀花、觀果，又是香花植物，應用特性多方面。用種子播種來繁殖，並不困難。



台灣海桐小黃橙果，團聚成球。

●火筒樹 (*Leea guineensis*)

分佈於本省中、低海拔地區，常綠小喬木，株高5尺，三回的羽狀複葉，5~7月開花，12月以後樹上就有暗紅色的果實出現。

本種生性極強健，生長快速，全省由南至北，平地至中海拔均可種植，觀花、觀果價值均各具特色。

●春不老 (*Ardisia squamulosa*)

在台灣各處庭園常出現的常綠灌木，約與一人同高，倒卵形葉，長約6~10公分，全緣。新葉鮮紅，叢生枝端，夏季為其主要花期，淡粉色小花，並不怎惹人注意；但11月後就有果實出現，初呈綠白，而後變粉紅、鮮紅，最後又呈紫黑色，一系列色彩變化，使春不老的觀果價值非凡。

陽性樹，耐性強韌，却不能耐寒，自北至南的平地栽培都不成問題，是庭園中常用的綠籬材料。台灣的蘭嶼與綠島有原生種的春不老。繁殖可用扦插或分株。



春不老的果實由淺綠轉紅再轉紫紅，變化豐富。



火筒樹的暗紅果實

在12月，台灣的山區已可見紅葉片片，黃葉飛舞，滿山正在變色！而平地比較不容易欣賞到同種落葉樹把外衣褪換成如此賞心悅目的景象。根據許多相關研究指出，綠葉在落葉前變色必須有下列的條件：

1. 畫夜溫差大(15°C)，夜間溫度最好能降至5~6°C。
2. 白晝最好日照充足，無陰雨厚雲。
3. 植物的細胞液中需含有單寧。
4. 種植地的土壤呈乾燥狀。

因此，紅葉的形成不僅與樹種有關，也受栽培地的環境條件之影響。山區的日日夜溫差比較大，在不降雨又陽光充沛下，不少的本地樹種，在早冬就有紅葉出現，吸引一群群的人潮上山，在近幾年也逐漸形成一股風潮，甚至還有國外旅遊賞風的雅緻。

12月上山可以見到的變色(紅或黃...)植物有無患子、青楓、杜英、刺葱、台灣山毛櫟、黃連木、欖仁、山櫻、錫蘭橄欖、樟樹、銀杏、青楓、台灣紅榨槭、台灣掌葉槭、楓香、油桐、落羽松、美國鵝掌楸、山柏...等。現選擇一些重要者加以介紹如下：

● 槭(欓)樹科植物

槭樹科植物是紅葉植物之大本營，本地原產者如台灣掌葉槭、青楓、台灣紅榨槭、尖葉槭、台灣三角楓…等，幾乎已遍佈台灣之平地至高山。日本對掌葉槭獨有所鍾，更是投入相當多的心血培育出許多漂亮的雜交掌葉槭，甚至一年多季都能展現漂亮的彩葉。



紅紫葉的掌葉槭

● 青楓 (*Acer serrulatum*)

在平地許多庭園中較常見之一槭樹科植物，又叫青槭，亦是小～中喬木，對生的掌狀五裂葉，鋸齒緣，葉柄非紅色。多用播種來繁殖。

此植物比較適合平地庭園中栽培，但燠熱的南部栽培，生長不如北部，若在中海拔的山區栽培則生長更好，而且冬天可以欣賞紅葉；台灣南部平地要欣賞紅葉，是不太可能的事。



台灣掌葉槭染紅了山區

● 台灣紅榨槭 (*Acer morrisii*)

本地產的落葉小喬木，株高約在10公尺上下，多分佈在本省的中部或東部山區，中海拔至高海拔都有，筆者曾至阿里山眠月神木區看到許多此樹種。葉呈掌狀淺五裂，葉長寬約5～10公分，緣有鋸齒，葉色深綠。比較特殊的是它的葉柄呈紅色，長約5～7公分。

此樹種在平地燠熱處難以適存，上山倒不難見到，它生性強健，生長快速，在生育環境惡劣處亦可生長，繁殖以播種即可。



登高山時，別忘了欣賞台灣紅榨槭。

● 無患子 (*Sapindus mukorossii*)

株高10～20公尺的落葉喬木，分佈於本省低海拔之闊葉樹林中。一回羽狀複葉，有小葉4～8對，小葉呈披針狀。晚春至夏開花，秋天結出褐色圓球形的核果，可如彈珠般做孩童們的遊具，又因果皮含皂質，可用來洗濯。

落葉前，葉片會轉變成亮麗的金黃色，相當耀眼。它生長頗速，病蟲害不多，擇土性不強，適台灣平地庭園生長，用播種繁殖即可。




無患子的黃葉在寒風中搖曳

●台灣欒樹 (*Koelreuteria henryi*)

現今頗紅的本地產落葉喬木，成木呈傘狀，是相當優異的遮陰樹，9～10月上旬開出鮮黃的頂生圓錐花序，隨即就結果，果呈紫紅色。自9月開始，它就開始一連串令人著迷的外貌改粧，12月時，有些樹枝上就掛滿了金黃色的葉片，更惹來驚異的眼光與讚嘆！

此陽性樹，生長快速，多用播種繁殖，亦可用扦插法。它生性強健，未曾見病蟲害，抗空氣污染，適種全省由北至南，由都市至山區，適應上都沒有問題，只要不種在陰暗處，生長易，管理工作不多。



台灣欒樹落葉前，一片耀眼的金黃。



黃連木落葉前，葉色美得令人暈眩。

●黃連木 (*Pistacia chinensis*)

漆樹科的落葉大喬木，本省產，多分佈於中、南部。一回羽狀複葉，歪披針形小葉，長僅3～5公分，是質感相當細緻的喬木。冬季落葉前葉會變黃或黃橙色十分具特色。

適全省平地栽植，亦有在都市中植為行道樹者，但不耐山區冷涼（3℃以下）的氣候。壽命頗長，日本亦曾引進栽植，為數不少。繁殖採播種法。



換粧的季節，楓香的葉子變了色彩。

●楓香 (*Liquidambar formosana*)

本地產落葉大喬木，也是本地相當重要的變色植物。掌狀三裂葉，互生，莖節處有一對明顯的線形托葉，葉面徑約10公分，細鋸齒緣。春天2～3月時萌發新芽，滿樹青翠，隨即開花；至11～12月，南部山區的楓香就開始變黃褐或紅色，北部則較遲。

此種適合全省由低海拔至中海拔處種植，都市中（台北市中山北路）也有植為行道樹者，因樹型完整，又具遮陰性，春來可觀賞其紅嫩的新葉，至落葉前又有一番新面貌。雖偶有病蟲害侵襲，破壞葉片的翠綠與完整，但幸好是落葉樹，每到新春又可煥然一新。◆