



與臭

山煙草全株異味甚重，難以接近。

共舞的花

白毛臭牡丹

如果你以為花都是香的，那就錯了！我們生活周遭充滿「臭味」的花還真不少，其臭氣的「威力」，有些尚可忍受，如臭菊、臭牡丹藤；有些臭味之強則非筆墨所能形容，如山煙草、臭濱芥。

這些異味煥發的臭花對人類也並非毫無貢獻，野地常見的雞屎藤、臭腺草，經過烹煮臭味便消失，可以入藥；而臭芥、臭牡丹藤臭味較淡，是庭園常見的觀賞植物。





臭牡丹樹也稱臭梧桐或海州常山



山奶草臭氣特強，令人退避三舍。



魚腥草腥臭味經煮熟後可完全消失

臭濱芥是臭花中的佼佼者

臭黃荊是馬鞭草科一員臭將





臭茉莉花形美，但全株有異味，美中不足。

植物界除了香花之外，還有另一類教人不敢恭維的臭花，這些「天賦異稟」的植物大都是全身充滿了異味，甚至連花朵也不例外。

臭花為什麼要散發異味，至少有兩個原因，其一是為了自衛。試想，當草食性動物、鳥類、爬蟲類、昆蟲乃至人類趨上前去，預備嚼食、啃食、啄食、採集或攀折其枝葉時，如果適時地聞到令牠們（或牠們）不快的味道時，相信不是立刻縮嘴縮手，就是放棄或走避，那麼臭花也就可以安然無恙了。

另外一個原因可能是為了吸引授粉者。人類當中有所謂的逐臭之夫，其他各類動物當然也會有喜歡異味的，特別是與咱們淵源甚遠的昆蟲，其種類之多與食性之廣，根本超乎人的想像，說不定我們認為無法接受的臭味，正巧是牠們求之不得的美味哩！各種臭花們所開出來的花或植株其他部位揮散出來的異味，自然就會吸引逐臭的昆蟲，來為它們傳粉做媒。

臭花大本營

根據資料的蒐集以及筆者的親身經驗，發現「馬鞭草科」家族是臭花的大本營，其成員中享有「臭名」者起碼在8種以上；而十字花科的「臭濱芥」和桔梗科的「山奶草」是臭花中的佼佼者，其臭味之強與令人難受的程度，還真難以用筆墨來形容！最常見的臭花則非「雞屎藤」、「臭杏」、「山煙草」莫屬，它們幾乎就分布在我們生活環境的四周，想親自體驗它們臭氣的「威力」，隨時都可如願。

瞧！臭花榜

為了讓大家對各種臭花有較詳細的認識！以下就逐一地加以介紹：

●雞屎藤：多年生草質藤本，葉片對生，葉形及葉面大小極富變化，有明顯托葉。全株臭味極重，但烹煮之後便可消失，故可入藥。夏至秋季開鈴嚙形淡紫花，冬季結圓球形黃褐果，皆十分玲瓏可愛，常見於山野。

●雞屎樹：好陰性的灌木

，與雞屎藤同屬茜草科家族。種類頗多，個個皆臭。葉片通常為橢圓形，對生，也具有托葉。小花白色，果實通常為藍色，果枝可供觀賞。

●臭茉莉：高約1~2公尺的灌木，葉廣卵形，兩面有毛。花白色，重瓣，簇集在枝頭，形如重瓣茉莉，但全株充滿異味，是美中不足之處。

●白毛臭牡丹：灌木，小枝葉片均密生毛茸。葉廣卵形，長10~16公分，寬6~9公分，全緣或有疏鋸齒；花白色，頂生，花冠細長，果實藍綠色，被宿存萼所包裹。

●大青：也叫「臭腥公」、「細葉臭牡丹」等。小灌木，葉橢圓狀披針形，長6~15公分，寬2.5~6公分，全緣或偶有鋸齒。花淡綠或綠白，花蕊突出花冠外，果實藍綠色。

●臭娘子：馬鞭草科植物，又名「牛骨仔樹」。小喬木或灌木，葉對生，長橢圓形，長6~12公分，寬4~6公分，全緣，背面有密生的腺點。聚繖花序或圓錐狀繖房花序。花甚小黃綠色，常生長於海濱。

●臭黃荊：馬鞭草科植物



臭菊是常見庭園花卉

，也叫「小葉魚臭木」。小喬木，全株平滑；葉菱形，長5~7公分，寬3~4公分，全緣或具疏鋸齒。三出聚繖花序，花冠淡黃色，裂片短於冠筒，產於北部和東部。

●**臭牡丹樹**：也叫「海州常山」、「臭梧桐」等，馬鞭草科成員。落葉性大灌木或小喬木，嫩枝及葉面均被有褐色軟毛。葉對生，三角狀卵形或闊卵形，全緣或上半部具疏鋸齒。聚繖花序在枝端排列成繖房狀，花冠白色，雄蕊花絲細長，熟果深藍綠色。

●**臭牡丹藤**：又名「龍吐珠」。常綠蔓性灌木，葉對生，卵狀橢圓形，全緣，先端銳尖。聚繖花序作圓錐狀或繖房狀排列，萼乳白色，宿存性，花冠鮮紅色，雄蕊細長而挺出花外。臭味較淡，是理想而常見的觀賞植物。

●**山奶草**：桔梗科植物，多年生藤狀草本，分枝甚多，全株臭氣特強，令人自然退避。葉互生或對生，卵形至三角形，長1~3公分，寬0.5~2公分。夏季開花，花朵單生，花冠淡綠色，管狀鐘形，蒴果。產於中央山脈海拔2500~3400公尺高地。

●**臭濱芥**：十字花科植物

，又名「臭薺」。一年生草本，莖葉叢生，莖直立或略呈傾臥性，高約15~25公分，但冬季常呈低矮的薔薇形狀態。葉片羽狀深裂，總狀花序腋出，花白色，細小，短角果。歸化植物，分布中、北部海濱或荒地曠野間。

●**臭菊**：菊科植物，本名「萬壽菊」。一年生草本，莖直立而多分枝；葉互生，一回羽狀複葉或裂葉，小葉邊緣有鋸齒。頭狀花莖約5~12公分，花色有黃、橙、白等，青臭味頗強，但尚可忍受。本省庭園常見的花卉。

●**臭杏**：藜科植物，也叫「臭莧」、「臭川芎」等。一年生草本，莖多分枝，叢生而直立，全株具有香臭難辨的強烈異味。葉互生，卵狀或長橢圓狀披針形，鋸齒緣或波狀緣。穗狀花序由多數綠白花共同組成；胞果扁球形。路旁、荒地頗為常見。

●**臭臊草**：三白草科成員，別稱「蕺菜」、「魚腥草」、「臭瘡草」等。多年生草本，具匍匐性根莖，全株腥臭味極強。葉互生，心形，全緣。夏季開花，穗狀花序頂生，花序下方有四片白色的花瓣狀總苞片，花瓣缺如，小花密生而

呈黃綠色，蒴果。腥臭味經煮熟後幾乎完全消失，故可入藥及當茶餚。產全省低中海拔山區稍潮溼處，常群生。

●**山煙草**：茄科植物，別名「樹茄」、「土煙」等。常綠灌木，高約2公尺餘，全株密被黃褐色星狀毛茸，葉卵狀披針形。春、夏季開花，聚繖花序被星狀毛所覆蓋，花白色，輪狀；果成熟時黃色，形如袖珍枇杷。全株異味甚重，難以接近。常見於全省曠野及低海拔地區。

●**福木**：金絲桃科植物，為常綠喬木，葉對生，厚革質，橢圓形或卵形，全緣，長約12公分。雌雄異株，花冠淡黃色，萼瓣皆為4枚，核果黃熟，徑約2公分。雄株無啥臭味，但雌株的果實則臭氣撲鼻，是美中不足之處。

●**臭節草**：芸香科植物，也叫「臭蟲草」、「蛇皮草」等。多年生草本，高約50~90公分，全株有強烈氣味，香臭因人而異。葉二~三回羽狀複葉，小葉紙質，綠白色，橢圓形或倒披針形，具透明腺點。夏至秋季開花，聚繖花序頂生，花冠白色，瓣4片，雄蕊7~8枚，蒴果。散生於全省低海拔荒野或樹蔭下，全草有毒。