

上期已經介紹過病害的防治措施，現在就來談談蟲害對植物的影響及防治方法，常見的蟲害有：

介殼蟲——它的家族頗大，種類極多，共同的特徵是背部有硬實的介殼。蟲體有白色、黑色及咖啡色等，有的長著棉花般的分泌物，有的則十分光滑；當其寄生在植物的莖、枝或葉上，則吸食其汁液，使植株產生黃斑並逐漸枯萎老化致死。蟲害發生初期可以棉花棒沾酒精或肥皂水清除，後期除剪去嚴重的枝條，並須以撲滅松、大滅松、夏油或馬拉松殺之，榕、菊花、七里香、桂花等均常見。

蚜蟲——危害花卉相當嚴重的一種害蟲，體小，多呈綠色，有它在就有螞蟥，因為螞蟥喜歡吃它分泌的甜液，故又有「螞蟥的乳牛」之稱；且會傳染毒素病，其影響比吸食汁液，造成嫩芽枯萎、花瓣縮縮或畸形還嚴重。初期可以蒜頭切絲泡水噴灑，或噴灑大滅松、撲滅松、馬拉松等藥劑。繁衍相當快速，尤以春、秋兩季為甚；危害的花卉為玫瑰、康乃馨、菊花等。

螞蟥——如前述，常與蚜蟲並存，對植物無重大傷害，但常在其上築巢生育，影響植株根部。盆栽可用浸水法驅除，一般可以糖液加硼砂誘殺之，或施用陶斯松、螞蟥98等藥劑，玫瑰、桂花等均常見。

薊馬——危害植物花部最常見的害蟲，尤其是白色具香味的花卉，如百合、柑桔類、夜來香等；亦有危害葉部及球

根的薊馬，體細長，約0.2~0.3公分，呈黃褐或黑褐色，幼蟲及成蟲均會吸食汁液，影響花朵生長，球根類則使其萎縮、褐化。保持盆土濕潤是預防的最佳利器，因其喜乾燥高溫環境，發生時可以速滅松、撲滅松、馬拉松、吉斯靈等噴佈，康乃馨、菊花、唐菖蒲、孤挺花等均常發生。

蟎類——即俗稱的「紅蜘蛛」——常危害植物的莖、葉或根部。有葉蟎及根蟎之分，葉片被吸食後呈現許多灰白或銹色斑點，使葉面縮縮，甚且黃化、枯萎。葉蟎多為紅褐色的，亦有黃綠色者，根蟎則為



常見的花卉蟲害

撰文／黃瑤娜
灰白色略透明，成蟲體長約0.3~0.5公分，若環境乾燥，保持潮濕即可防治；另洗衣粉稀釋液或紅辣椒泡水噴灑亦可收效，最後不得已可施用大克蟎、陶斯松、百蟎克等藥劑噴之，劍蘭、洋蘭、菊花、康乃馨等均常見。

粉蟲——其若蟲均附著在葉背吸食植物汁液，以至枯萎，並常引發黑煤病或為毒素病之媒介。成蟲長約0.1~0.2公分，翅表面覆有白色臘粉，喜乾燥環境，春、秋兩季發生嚴重，溫室內尤甚，非洲菊、洋桔梗、唐菖蒲、聖誕紅、西洋杜鵑均常見；可用洗衣粉水噴

灑或以毛刷沾著刷除，嚴重時施用馬拉松、大滅松等藥劑殺除。

軍配蟲——又稱「花編蟲」，多於植物葉背活動，吸食汁液，使葉背呈黃銹色，葉面出現白斑，漸而整面灰白，使植株生長緩慢、落葉，最明顯的是其留在葉背密密的黑色蟲糞；成蟲長約0.4公分，喜乾燥，可常以噴水防治。發生時以馬拉松、速滅松噴佈，全年均可見，以4~10月最多，杜鵑是最大寄主，其餘如茶花亦有。

蛞蝓與蝸牛——前者為無殼軟體動物，後者為有殼軟體動物，雖非蟲類但常出現於花園中，亦頗傷腦筋。喜咬食花瓣嫩芽、果實，多在中央留下不規則的孔洞，於夜間出來覓食，所經之處並會留有一條灰色透明粘液。它有一怪癖——嗜酒，故可備一杯啤酒置於病株旁誘之，隔日即可發現其溺死杯中；量多時可以聚乙醛誘殺，3~10月發生最多，洋蘭、草花類、非洲菊等均可見。

毛蟲——許多蝶或蛾的幼蟲均會咬食花朵或嫩葉，如夜盜蟲（斜紋夜蛾）、擬尺蠖（銀紋夜蛾）、玉米穗蟲（番茄夜蛾），另小白紋毒蛾、柑毒蛾等幼蟲亦危害嚴重，直接抓除效果最佳，但避免直接以手抓，因部分蟲體的絨毛上有毒，亦可以速滅松等殺蟲劑噴之防除。

其他還有蠅類、蜂類、甲蟲、蝗蟲、浮塵子等，其防治方法與毛蟲近似，因數量較少故不在此另述。