

談到櫻花，一般人立即會聯想到日本，對於這種冬來葉落盡，僅留枝桠含蕊苞，在剎那間全面盛開，一片花繁似海，壯觀、絢麗得令人讚歎！但陣風吹過，又落英繽紛，四處飄零，淒美絕倫的櫻花，日本人特別偏愛，將其捧為國花，詩詞歌詠不斷。

其實亞洲地區除了日本櫻花栽培特別多之外，我國、韓國乃至印度喜馬拉雅山區都有自生櫻花的分佈。根據學者的調查，台灣地區野生櫻花有緋寒櫻（山櫻花、山櫻桃、福建山櫻）、高山小白櫻、蘭嶼野櫻花、太平山櫻花、霧社山櫻花、山白櫻、阿里山櫻花等。而陽明山、霧社、埔里、廬山、阿里山、谷關、新店、烏來、太平山……等地，都是冬末春初不同時期的賞櫻勝地。

冷涼·乾燥·向陽


如果你想享受大片櫻花怒放的情趣，可以在每年花季前往上述地區觀賞。如果你想在自家庭園中種幾棵把玩，則應注意櫻花的原生地多為冷涼、高燥、向陽的地方。如果做為盆栽，平常應放在陽光充足、通氣良好的地方，開花前若移到室內觀賞，也要放在臨窗明亮處，花謝後即行移出。雖然櫻花對各種土壤都能適應，但以砂質壤土生長最佳，可以在植穴或盆底放些磚瓦碎片或石礫，便於排水，其上用砂壤或壤土混合砂礫及少量腐熟堆肥栽植。

繁華盛一時， 落英多繽紛的櫻花

賞花觀果兩相宜

櫻花的品種固然多達數百種以上，但台灣地區除了中海拔以上的高冷地可適合各品種栽培以外，低海拔地區以栽培本地原生種較佳，例如緋寒櫻，原產台灣中北部300~1,000公尺闊葉林中，風土適應性強，開花又美麗，為一優良適宜的品種。

苗木以選擇枝條勻稱、應用根群發育良好的實生苗為砧木，經嫁接成活並癒合良好者為佳！移植時期以每年12月落葉後最適宜，露地種植，生育期間，可以



台灣原生種櫻花—緋寒櫻

採用放任式管理，不需要供給太多水分、肥料，每年酌施一兩次有機肥或複合肥料即可。採用自然形整枝，除隨時剪去徒長枝外，只在冬季落葉後將過密的細弱、病蟲害枝條稍加修剪即可。

同地區的寒緋櫻，花開花謝，約可維持10天，花後結成綠色小果，繼而變紅，熟透後帶黑色，綠葉紅果相襯托時期也頗有觀賞價值。熟透果實，甜中帶酸澀，可以食用。如要實生繁殖，可以將其除去果肉後以濕砂層積到第2年早春播種，在夏季時實施芽接或秋季行切接或割接，約過5年可以開花。



種植櫻花，應給予陽光充足、通風良好的環境

文／張森松