

文・圖／張森松

# 風姿綽約・ 高尚幽雅萬年青

**市**面上許多觀葉植物如黃金葛、蔓綠絨、黛粉葉、千年木、竹蕉……等，都被花木商人冠上「萬年青」的名稱，真正的萬年青反而被埋沒，不為一般人所認識。

## 分佈與植株性狀

萬年青古名「藜蘆」或稱「藍」，屬於百合科，學名 *Rohdea japonica*, Roth. et. Kunth，分布於我國廣東內陸及日本沿海，台灣地區除了由日本及大陸引進的園藝改良種之外，在海拔1,200～2,500公尺的山區也有原生種「台灣萬年青」（學名 *Rohdea watanabei* Hay）。

萬年青在地面上看不到明顯的莖部，其根莖橫臥地表下，縮短肥大如芋頭一般，向下生根，向上長葉，形成根生葉的狀態；每個葉片有縱行脈數條，縱行脈間還有橫的支脈連接，可將根部吸收的養分、水分直接送達葉片先端，並分佈到整個葉片。

## 葉姿葉色欣賞

萬年青可以說是觀葉植物中的藝術極品，它的葉片姿色變化無窮，無論大小、厚薄、形狀、葉質、葉色斑紋都隨著品系甚至個別植株而變化，以大小來說有

長達50公分的，也有短於15公分的；葉質有像柚皮般粗糙的，也有如少女肌膚般光澤細膩的。

葉形的變化更多，較具代表性的即有十餘種：



出現優美葉藝分化的  
小芽，可分離培養。

一群鳥雀的嘴聚在一起。

(一)獅子葉：葉片捲曲像獅子頭的毛

萬年青的葉片斑紋變化，更是神奇玄妙，不下於國蘭中的金

(一)細葉：葉幅較窄，成線形或細長披針形。

(二)廣葉：葉廣而長，基部和末端略成圓形。

(三)劍葉：葉片像一把劍，直而先端尖銳。

(四)鎌葉：葉彎如鎌刀

(五)波葉：葉緣波浪狀

(六)筒葉：葉緣內捲，使葉片成圓筒狀。

(七)樞葉：葉的兩邊捲起成凹溝狀

(八)龍葉：葉片主脈部份形態特殊，像另一細葉在上面如龍起舞般。

(九)翹葉：葉面皺縮

(十)熨燙葉：葉緣折返，像是經過熨斗燙過一般。

(十一)群雀葉：多數葉端變形，像

線蘭，為欣賞的焦點，較重要藝斑如下：

(一)白斑：葉片部份白化，形成白色斑塊或紋路。

(二)根岸斑：葉片周緣為連貫或斷續的綠紋，內為中透白斑，非常華麗。

(三)胡麻斑：綠葉上佈滿白斑點，有如撒上白胡麻一般。

(四)砂子斑：葉上深淺不同的細點，有如撒上砂子一般。

(五)鑲邊：綠葉邊緣鑲有白或黃色條紋，僅在葉片先端者稱為「爪」，如果圍繞葉片大半以上稱「覆輪」。

(六)虎斑：葉面上間有黃或白的橫斑紋，如老虎身上斑紋。

(七)圓斑：濃綠葉面上有白色、黃色或淺色模樣斑紋。

在一株萬年青上可能有一種或兩種以上葉藝出現。

### 繁殖方法

萬年青以分株繁殖為主，地下莖在葉落後逐漸肥大，在葉基部位常可萌芽長成新株，當新株佈滿盆面時，即需換盆，可同時進行分株繁殖。時間選在春或秋天，氣溫不至過冷過熱時；先將整株自盆中取出，清除舊土，洗淨根莖，觀察新芽生長情形，決定分株位置，用銳利的美工刀或薄刀片切開，傷口塗上大生、免賴特、貝芬替或炭粉等之一般菌，再重新種植。原則上發育良好的新芽，即上有葉片、下有根群者都可分開，單獨培養。如果缺根或葉片的芽體，則要依附在其它植株一起培養。

如果想選育新品種也可用種子實生繁殖，充分發育成熟的萬年青可在5月左右開花，當雌蕊散發香氣，柱頭分泌粘液時為授粉適當時機，可用鑷子夾取雄蕊花粉輕沾柱頭，花後結實，到12月或第二年元月成熟，可採取陰乾，貯藏到3~4月時浸水軟化除去果皮再播種。

### 栽培管理

萬年青因品系不同，環境的適應性也有很大的差異，例如根岸系中透白斑面積大時，易發生日燒現象，採光宜弱，灌水要多；縞甲系則性強健，採光和施肥可多些。一般而言，萬年青喜歡稍陰、帶濕氣、不積水的環境，培養土可用炭塊、砂礫、磚瓦碎片、發泡煉石、珍珠石、蛭石、泥炭苔、細蛇木屑、腐葉土、腐熟堆肥等選擇3~5種性質不同的

材料混合或分層栽植。

在繁殖培養階段可用大盆或栽培箱群植，成長後則移到精緻的瓷釉盆中以供觀賞。盆底放置2~3層紗網，上面放一層炭塊或磚瓦碎片以利排水；萬年青植株置盆中央，使根部儘量伸展，再加入發泡煉石、砂礫或珍珠石混合泥炭苔或細蛇木屑的均質材料，最上面薄施一層腐葉土或腐熟堆肥，並覆蓋水苔保濕。植後一週要充分灌水並遮陰，成活後按

品系給予適當光照；光線過強，葉片的壽命和品質會降低，過陰則植株徒長、衰弱，積水易引起根腐病，過乾則發育不良，這些都會表現在植株上，應注意觀察和調整。春、秋季節每天灌水一次，夏季除早晚灌水之外，並多向葉面噴水，冬季灌水宜少。生長期中每月施稀釋的有機液肥一次或隔週以速效性高級花肥1,000倍液澆灌一次，促進生長。



三、五株同植一盆，顯得格外繁茂。