

球根花卉(一)

古代詩人莫不以「仙風道骨」來形容臨水獨立的水仙(圖為中國水仙)

水中寒蕊吐幽香，
仙骨幾兼梅雁行；
堪怪天公有心否，
獨教斯卉弄清香。

近年來，偶爾走過街頭或到百貨公司購物時，不難發現香水、香精的專賣店、專櫃如雨後春筍般地開設，各式各樣的香水产品配合著令人迷眩的精緻包裝設計，往往吸引著各年齡層的消費者流連忘返，加上在低價位又精巧的樣品香水強力傾銷之下，似乎「香香族」的人口突然間提高了許多。

香花植物族衆多

其實「聞香」原本就是人的本能之一，「逐香而居，聞臭則逃」是大多數人正常的反應之一。目前，有部份的科學家們正努力解開「香味」和人類情緒之間的奧妙關係，例如薄荷和鈴蘭的香味具有提神的效果，而檸檬香則可使人減少犯錯。科學家們認為，任何一種愉悅的香氣，都可以使人的情緒和緩、精神充沛及減少壓力。由此可見，人們喜愛香花植物雖然沒有很明顯的理由，其實仍有其學理上的解釋的。

談到香花植物，一般人心中最直接的定義往往是「會散出香味花朵的植物」，如常見的玉蘭花、茉莉花、野薑花……等等，



其實，除了這些香味濃郁的香花植物之外，尚有很多香味較清淡，卻外表出衆的植物，如玫瑰、睡蓮、水仙等也都可歸屬於香花植物一族，因此，廣義的香花植物，範圍相當大，舉凡植物的花

、果實、根、莖、葉等器官，只要能抽取提煉出香精來的，都可泛稱為香花植物。在衆多的香花植物裡，本期將為您介紹的是球根花卉中的香花植物，也是這一季裡相當引人注目的一群。

水仙、梔子花、梅、菊、桂花、茉莉、百合等在古代合稱為「七香」，其中，就有水仙、百合二香屬於球根花卉。球根花卉是很大的一個家族，她最大的特徵是在植株的地下部（莖基或根部）特化成肉質器官，具有貯藏養分、水分及保存芽體的功能。由於肉質器官的形態不同，球根花卉又可分為鱗莖類、球莖類、塊莖類及塊根類，分別是莖及根的變形。球根花卉並不特別隸屬於某個科屬，而是遍佈於各科屬之間，包含了石蒜科、百合科、鳶尾科、菊科、天南星科、薑科、酢醬草科和毛茛科等各類不同植物，本文則針對具有香味的球根花卉作介紹。

水仙的種類

石蒜科中最受歡迎的應該是水仙花了，古代詩人莫不以「仙風道骨」來形容臨水獨立的水仙花。由於其花期正好臨近於農曆年前後，因此水仙也變成年節應景的主要花卉之一，相當受歡迎，是極富有中國味的花味。

本省栽培的水仙分成兩大類，一為中國水仙，原生於中國、日本、南歐，多為一莖多花，具濃郁香氣；另一類為西洋水仙，大部分為一莖一花，花大而色艷，但香氣清淡幾乎無香味。

中國水仙除了一莖多花、具香味等特徵之外，由花朵的外形又可細分為單瓣品種：花冠銀白、副花冠金黃呈杯狀、高雅潔淨，稱之為「金盞銀台」；另為複瓣品種：黃白花瓣捲裂層層相疊，團花簇蕊，又稱為「百葉水仙」或「玉玲瓏」，香味則略遜於

單瓣種。西洋水仙如喇叭水仙、大杯水仙、口紅水仙等，產地分佈於西班牙、葡萄牙、瑞典、義大利、英國、荷蘭等地，近年每逢年關，也有業者將西洋水仙植成盆花出售。至於可抽取香料的主要品種則為中國水仙、口紅水仙及黃花水仙等系統，大多利用揮發性溶劑來抽取，水仙花的香精油大多用來和玫瑰及素馨的香

精調配，作為高級香水的原料。


由於本省常年溫暖，並不適合水仙球的繁殖及養成，因此，每年10月份左右皆大量由大陸及歐洲地區進口球根，進口的水仙花球主要以母球的大小為分級標準。有興趣栽培水仙的朋友，不妨提早到花市或花店去選購水仙花球，畢竟，能欣賞自己培養的水仙花，個中樂趣可不是買已開



以西洋水仙黏貼成的花車(攝影 周明燕)



屬石蒜科的孤挺花(攝影 周明燕)



俗稱「愛麗絲」的鳶尾花 (攝影 周明燕)

花的水仙可以比擬的。

如何使水仙不裝蒜

選購水仙球根並不難，只要掌握幾個原則，保證包君滿意：

(1)選擇外表清潔、無病蟲害的健康球根。

(2)母球的形狀大，其內部的花芽也會相對較多。避免購買子球太多者，以免買到的水仙只長葉片而不開花。

(3)球以堅硬、充實者為佳，最好拿在手中時有重量感，表示此球生長充實，蓄積的養分也足夠。

買回來的球根，只要放在水盆中，養個1個月到35天即可開花，相當容易培養。在培養的過程中，最需要注意的是要給予充分的陽光，如此水仙花的葉片可順利行光合作用，供給開花更充裕的養分，並可避免葉片徒長，如此養成的水仙，才會肥肥壯壯且花期較長；培養期間，最好能每5~7天換一次清水，以利根部

的生長及呼吸，在光照充足的環境下，不必再給予肥料，免得造成鹽害(肥傷)。如果買回的球根欲配合春節觀賞，可以放在通風良好的地方陰乾貯藏，至春節前30~35天取出浸水即可。

由於水仙花球抽花與氣溫有相當直接的關係，可以利用氣溫來推測其開花時間。一般而言，平均氣溫在15℃左右，則需30天；如果高於15℃(20℃以上)，則需20天；低於15℃(10℃左右)則至少需40天的培養期。不過，氣候的變化並不是如理想般地易於掌控的，當遇到異常的氣溫時，往往會造成花期提早或延後，那可就十分煞風景了！

這裡提供讀者一個小小的祕訣，當溫度異常時，不妨以人工的方法來改善，以如期開花。人工控制的方法相當簡單，當氣溫太高時，可以設法降低水溫(如加冰水、冰塊)，如此可延遲近一週開花；如果當年的氣溫太低

，也可以利用隔水加溫的方法，利用隔熱來提高水溫，以促使開花即可。不過，無論加溫或降溫，都要小心別燙著或凍傷了球根哦！

水仙開花後留下來的鱗莖雖可以再加以培育，但在本省高溫的天然環境裡，花芽分化的條件不佳，不容易養出漂亮的球根來，翌年縱使會開花，也往往花朵小、花數少、品質差，因此，大可將開完花的球根丟棄，待明年再買新的鱗莖培養，以確保最佳觀賞品質。

石蒜科裡除了水仙花之外，尚有在晚春至炎夏開放的孤挺花、火球花、台灣原生特產於9月至10月開花的金花石蒜及有「清秀佳人」之稱的蔥蘭。這些石蒜科的球根花卉，不僅花形大且花色艷麗，觀賞價值極高，但由於香味較淡，因而並未被列入香花族系列，其實，當大面積種植時，仍然具有其獨特的氣味。 ◆