

矯健挺拔 虎尾蘭

虎尾蘭又名鳳尾蘭，但它並不是蘭花，而是屬龍舌蘭科的多肉植物，初看起來，並不覺得它有什麼特別艷麗吸引人的地方，但如果您仔細地瞧一瞧，您可以發現它是一種非常耐看，具有

觀賞價值的植物；矯健挺拔的風姿和濃淡明暗相間、斑駁輝映的葉色，確實與老虎的尾巴在神韻上有幾分神似，很值得您慢慢地欣賞。

分類簡介

虎尾蘭原產南非洲、熱帶非洲和東印度，流傳各地，經過長久的栽培和許多園藝家的精心改良，除了原始品種以外，也產生了許多變種和園藝改良種，總數不下數十種之多，較著名的有棒狀虎尾蘭、石筆虎尾蘭、大葉虎尾蘭、扇葉虎尾蘭、短葉虎尾蘭、白玉虎尾蘭、黃金虎尾蘭、白紋虎尾蘭、黃金短葉虎尾蘭、金邊虎尾蘭、尼羅虎尾蘭及斑葉小虎尾蘭等，無論高矮、大小、葉子的形狀、色澤及紋路變化都非常豐富。在台灣地區常被栽培利用的品種有金邊虎尾蘭、管狀虎尾蘭、短葉虎尾蘭、金邊袖珍虎尾蘭等。

風土適應性

虎尾蘭葉肉肥厚，有類似多肉植物的性質，但是它比一般的多肉植物還要強健，適應性還要廣。例如：它非常得耐旱，在一次澆水過後，一、兩個星期，甚至一、兩個月不給它澆水也死不了，它也相當耐濕，甚至插入淺水中都可以活上個把月；在強烈陽光的全日照之下或在屋邊、牆

虎尾蘭雖然會開花，但由於具有「自交不稔性」，故一般都行無性繁殖。（圖為管狀虎尾蘭）



角、樹底下的半蔭狀態中，它都可以生長得非常好，而在室內光線不足的陰暗處，也還可以繼續生長，而且在此種狀態下，也可以維持良好的植株狀態好幾個星期以上；土壤方面，固然以砂質壤土生長最好，粘壤土、砂地乃至於貧瘠的石礫地，它都能生長；溫度方面，在夏季最炎熱的天氣，它能照樣生長，冬天雖冷，只要維持攝氏5、6度以上，也不致於對它造成傷害。因此虎尾蘭可以說在各種環境狀態下都可以生長，只要你種活它以後，忙時根本不用去管，閒來稍加整理就可以欣賞它美妙的風采。

繁殖

虎尾蘭雖然會開花，但是因



瞧！這斑駁輝映的葉色，是否和老虎尾巴有幾分相似？（圖為金邊虎尾蘭）




為具有自交不稔性，也就是本身的花粉無法使其雌蕊授精，因此天然環境下不容易結種子，除了育種上用人工授粉，取得種子實生繁殖以外，一般都不用種子繁殖，通常以分株和葉片扦插來繁殖。

虎尾蘭的大株在生長旺盛的春、夏季間很容易從植株基部分生出小株，一般品種每年每株可新生3、4個到7、8個小株，到小株長大帶有3~4條根時，即可與母株切開，待傷口稍陰乾後，另行培養。有些品種較不容易分生小株，可以將植株基部葉片輕輕剝離2、3片，小心不要傷到葉片內側腋芽，待傷口稍陰乾後，在植株基部壅培細砂至下部葉片基點，經常保持微濕潤狀態，可以促進小株的發生。

各品種的虎尾蘭都可以用葉片扦插繁殖，葉片較短小的品種以每一個葉片為單位，葉片較長大的品種可以7~8公分長為單位剪成一段，在葉片剝離或剪切的傷口陰乾後，斜插到潔淨的河砂中，注意葉片上下方向，不要倒

插，葉片大約 $\frac{2}{3}$ 埋入砂中， $\frac{1}{3}$ 露在外，保持砂土濕潤，在春天氣溫轉暖後扦插，約3~4個禮拜即可萌芽長根，3個月後能培養成小苗。

但是，帶金邊、白邊或中透斑的品種，因為其條斑的形成係生長點先端3、4層分生組織細胞



金邊袖珍虎尾蘭這類迷你品種除了用作盆栽之外，也可作為瓶景栽培。

中的一層葉綠素形成機能異常而產生條斑。用扦插繁殖時，新株由分生組織中生出，變異的一層新生能力較弱，新芽都由其它層細胞生成，因此有條斑的品種扦插後，生成的新株都變成沒有條斑，所以條斑品種僅能用分株繁

殖。

栽培管理

虎尾蘭的適應性雖然很強，但在有機質含量高的砂質壤土中，在半蔭、保持濕潤的情況下，生長最良好。栽培管理必須要配合環境情況，在強光、高溫下要多澆水、多施肥，可以發揮最大的生長力；冬天低於攝氏15度的溫度及要移到室內觀賞時，要控制澆水，不施肥，降低其生長，並避免植株腐爛。對於袖珍型條斑品種因生長力較弱些，儘量以較好的管理，並避免在極端的環境中栽培。

利用

虎尾蘭可以在庭園中、簷下、窗邊、牆角叢植，也可以在走道旁、園邊列植作境界；條斑和袖珍型品種也常用作盆栽，或與其它花木做組合盆栽；迷你小型品種還可用在瓶景栽培，生長良好的葉片則是插花良好的陪襯材料。