

文竹

具有肥大肉質根的文竹及武竹，
生長強健，適應性強，

與 蘆筍的近親

武竹

甚至乾旱貧瘠的砂地都可生長，
極適合作為園藝入門的植物。

石刁柏屬 (*Asparagus Spp.*)

是百合科家族中重要的園藝作物，其中有供食用的，也有供觀賞的，蘆筍便是國人熟悉的食用蔬菜，它的近親——文竹和武竹，歐美通稱為「觀賞石刁柏」(Ornamental Asparagus)，則在觀賞植物中佔有重要地位，品種多、姿形美、用途廣泛。

種類和利用

文竹和武竹廣泛地分佈於世界各熱帶地區及部份溫帶較乾旱區域，總數約有150種，大都具有肉質根，直立或垂生的莖，真葉退化消失或變成鱗片、短刺，一般所稱的葉乃莖部變態之葉狀枝。目前栽培利用較多的品種如下：

文竹 (*A. Plumosus* Baker)

原產於南非，栽培歷史久而普遍，羽毛狀葉柔細飄逸，非常可愛，種在園地上莖成蔓性，長

可達5公尺，易分枝，久後木質化，基部生有細刺，夏季開白色小花，結成黑色小漿果，內含1~2粒種子，可供繁殖。

文竹除了小株可3~5株群植盆中供觀賞外，成株可切葉或切枝，供作插花或胸花、捧花之襯葉，尤其婚禮中新娘捧花常飾以文竹，長曳及地，別具一番風味。

長葉文竹 (*A. Plumosus* Var. *tenuissimus* Hort.)

為文竹之變種，株形與文竹相似，唯葉變長。

矮生文竹 (*A. plumosus* Var. *nanus* Nichols)

也是文竹的變種，株形近似，唯較矮小，更適合盆栽觀賞。

武竹 (*A. Sprengeri* Regel)

原產南非，葉扁平線形，密生，莖木質化蔓生，長可達2公尺，夏秋間開白色小花，具芳香，結成紅色小漿果，與綠葉相互輝映，更提高其觀賞價值。武竹



「文竹」的羽狀葉柔細飄逸，常被用作新娘捧花的襯葉。

生長茂密，葉色鮮綠，適合盆植觀賞，或用其垂生特性作成吊盆，或沿牆邊下垂做為窗台、陽台美化之用。

斑葉武竹 (*A. Sprengeri* Var. *Variegata* Hort.)

為武竹之變種，葉上帶白斑，有如雪花一般，在日本盛行在

一般所稱的「葉」，乃是莖部變態的葉狀枝。
(圖為「武竹」)



屋內將武竹栽培成懸垂狀，稱為「杉葛」，以其葉形似杉，莖垂生如葛藤，如為斑葉武竹則稱「斑痕杉葛」，作為夏季室內裝飾，益增清涼之感。

美麗武竹 (*A. densiflorus* Var. *Myers* Jessop)

又稱狐狸尾武竹，葉片細緻而密集，呈圓筒狀，有如狐狸的尾巴，可向上生長近直立，高達60公分，顏色鮮綠，形態優美，可切葉供插花應用，也可種於盆中供觀賞。

松葉武竹 (*A. Myriocaladus* Hart.)

原產南非，莖直立，叢生，高可達1~2公尺，葉細密簇生有如五葉松之針葉，姿形特殊，顏色鮮綠，也屬於武竹中的高級品，小株可種於盆中觀賞，大株也可切葉供插花及胸花使用。

柳葉天門冬 (*A. falcatus* L.)

原產熱帶亞洲及非洲，台灣中低海拔山野也有近似的野生種，為大型攀緣性品種，葉彎曲像鐮刀，邊緣波形如柳葉，色濃綠，生育茂盛，莖長達10公尺，有刺，適合做為綠籬或種於圍牆邊

，讓其攀緣生長。

繁殖方法

文竹和武竹通常用分株及播種法繁殖，3年生以上老株，莖枝叢生，擁擠影響生育，可行分株繁殖，並更新促進發育；小心從園中掘取或自盆中取出植株，儘量避免傷及肉質根，將根土輕輕除去，修剪老朽、受傷及過長糾纏的根及老殘莖葉後，以利刀將株叢切開，每3~5莖為一株，再重新種植。

如要大量繁殖則用播種法，種子在秋冬成熟後採收，貯存到翌春播種於砂土苗床，保持濕潤，如果土溫在20℃以上時，通常3~6週即可發芽，但松葉武竹和狐狸尾武竹等發芽力較弱的種類或購買來乾燥的種子，可先浸溫水一晝夜或以稀硫酸處理2~3小時，以軟化種皮再播種，可以促進發芽。

分株後或發芽初期的小苗應給予適當的遮蔭保護，避免烈日灼傷。

風土適應性

文竹和武竹都有肥大的肉質根，一般生長強健，適應性強，甚至乾旱貧瘠的砂地都可生長，但要有較佳的株形、葉色以及生產較高品質的葉材，仍需有良好的風土環境，並供給充分的水分、養分，栽培土壤應選擇有機質含量高、通氣排水良好、肥沃疏鬆的砂質壤土為佳。

雖然文竹和武竹大部份原產熱帶地區，在高溫下可以生長良好，但其耐寒性也相當強，只要有4~5℃以上就可在室外安然越

冬，如遇降霜則會寒害，應予遮蔽防護。成株相當耐陰，在室內靠窗明亮處可以生長，也可以在全日照強光處生長，可以說各種日照都能適應，但在半陰下生長的葉色品質、盆植株形最佳。

栽培管理

小苗發育到長出2~3枝新莖時，即可移至盆內培養，並逐年隨植株發育更換大盆，苗期培養土可用河沙和腐植土各半混合而成，大株則用壤土、砂、腐熟有機肥各 $\frac{1}{3}$ 混合而成，盆底並加一層砂礫或磚瓦碎片以利排水。

春至秋季，氣候暖和時，文竹、武竹生長旺盛，所需水分、養分也特別多，尤其夏天水分不足，容易發生黃化落葉現象，應充分灌水，保持土壤濕潤，並多施有機肥、液肥、複合肥料等；冬季則不施肥，並保持適度乾燥，以免積水引起根部腐爛。◆



葉細密簇生有如「五葉松」的「松葉武竹」，為武竹中的高級品。