



朵朵口紅花爭妍鬥艷，要為大自然裝點美麗的朱唇。

披綠紅妝 口紅花

綠葉先生們對於隔壁隨風飄逸的一群美少女真是著迷，她們披著綠紗，用胭脂口紅妝點朱唇，那鮮紅的唇色點綴在萬綠叢中真是好看。綠葉先生想和美少女們做朋友，他向秋風姊姊探問美少女的芳名，原來她們正是口紅花呢！



口紅花兼有觀葉和觀花的價值。



蒙娜麗莎口紅花。

口紅花（Lipstick Vine）為原產印度、東南亞、馬來西亞、南太平洋等熱帶亞洲的蔓性觀賞植物，當生長茂密，成叢開花時，宛如一群披著綠紗的女郎正在用胭脂口紅妝扮，紅花綠葉互為烘托，相得益彰，非常討人喜歡，兼有觀葉與觀花的價值。

■性狀與分類

口紅花屬於苦苣苔科（Gesneriaceae），口紅花屬（

Aeschynanthus Spp.）多年生草本蔓性或亞灌木狀植物，葉橢圓形，厚肉革質，對生或3~4片輪生於細長的蔓上。花形如口紅，有腓紅、橙色及黃綠色，單生或叢生於葉腋或枝蔓先端，花梗短而萼筒長，鮮艷突出非常美麗。

現在世界上的口紅花估計有170餘種，台灣地區在民國60年前後，曾從日本引進毛萼口紅花（*A. lobbianus* Hook，原產馬來西亞）、斑紋口紅花（*A. mar-*

moratus Moore，緬甸、泰國、馬來西亞產）、口紅花（*A. pulcher* 〈Blume〉 Don，原產馬來西亞、婆羅洲）及翠錦口紅花（*A. speciosus* Hook，原產印尼爪哇），但只在各地零星栽培。直到5、6年前引進蒙娜麗莎等品種，始在宜蘭、屏東、埔里等地方有較具規模的商業栽培。目前栽培較多的品種為蒙娜麗莎、細葉種及斑葉種，而以宜蘭地區栽培最多。

■繁殖

口紅花可以用扦插、壓條、種子播種等各種方式繁殖，但採種不易，播種後育苗時間也長；壓條法只要將細長的莖蔓每隔數節壓入培養土中，很容易發根成苗，但也相當費工及要有寬廣的空間才能進行。因此，仍以扦插法最實用而廣被採行，可取5公分長的插穗，插於砂床或水苔、泥炭苔等無菌介質中，除了寒冷的冬天外，各季節均可進行，約經一個月即可發根成苗，進行移植。

為了節省養成時間或預備做大規模吊盆栽培時，則將插穗以含NAA或IBA等成分的發根劑處理後，直接插於裝有混合培養土



美麗大方的口紅花壁飾。

的盆中，在溫網室裏集中育苗，方便管理。

■栽培管理

口紅花屬於著生性植物，莖節接觸培養土即可發根，但根群並不強大，因此培養土應疏鬆、通氣良好，使根部儘量伸展，並適度保濕，以維持生長元氣，可用泥炭苔、珍珠石、蛭石或蛇木屑、腐葉土、河沙等混合而成。用盆栽植時，盆底部放一層發泡煉石或石礫，以利通氣排水，高溫時期注意通風，並多澆水保持培養土濕潤。

一般在中度遮蔭的溫網室內栽培，光度在2,000~4,000呎燭光，稍強的光照可以促進花芽的形成和花苞的發育，但斑葉品種光照過烈容易曬傷。蒙娜麗莎品種適應性較強，台灣地區各季節溫度都能適應生長，但要感應低溫才能形成花芽與開花，宜蘭地區在秋後如有15~20℃低溫連續

一週左右，即可形成花芽開花，花期在每年10月到次年2月間，屏東地區因氣溫較高，花期較遲；斑葉品種花期也晚些；細葉口紅花適應力較弱，冬天氣溫低於15℃，容易發生寒害，葉片變紅，降低商品價值，夏季高溫則易發生炭疽病，引起損失，因此栽培面積已減少。

通常在調配培養土時混合些長久緩效性複合肥料或腐熟油粕類有機肥作為基肥，於生長期中再視發育狀況，以速效性高級花肥稀釋液噴灑作為追肥。每100平方公尺栽培面積每年三要素需肥量估計約需氮(N) 16.6公斤，磷酐(P_2O_5) 5.4公斤，氧化鉀(K_2O) 11.3公斤。

鈣元素對於口紅花也很重要，宜蘭地區近年發生口紅花莖蔓先端壞死，也就是一般人所說的縮尾，經花蓮區農業改良場研究人員研究分析就是缺鈣所引起，這種現象在天氣轉暖，新稍生長

快速，而又培養土過於乾燥或空氣過於濕重，通風不良、光照不足時特別容易發生，因為生長點分生組織細胞分裂需要鈣，鈣在植物體不易由老枝葉移轉至新稍，而鈣的吸收需要靠蒸散流的引力和光合作用供給能量，因此要澆水提高培養土濕度，通風降低大氣濕度，並增加光照來提升蒸散和光合作用，以利鈣的吸收，在緊急時也可用可溶性鈣稀釋液作葉面施肥，以為補救。

■利用

口紅花之花、葉俱美，各品種花期不同，也可用不同區域溫度差異或生長調節劑調節花期，可以有相當長的時間觀賞它那別緻艷麗的花朵；也可在花芽分化後取枝蔓扦插做速成迷你小盆花；就是沒花的時期，它那翠綠可愛的葉蔓也有相當的觀賞價值，很適合作為壁飾和吊盆植物。◆