

有潛力的台灣飲料植物 50 種【3】

隨著國人生活水準的提高，怎樣吃最健康？怎樣吃最補？怎樣吃可改善體質？已成為目前消費者飲食養生的重點，各種對身體有益的藥膳、生藥、山野草、藥茶、藥酒及飲料等產品或書籍都陸續開發上市，引起一陣風潮。例如李保真等編著的「中草藥保健飲料」搜集了438種的飲料配方；樂依士等編著的「中國祖傳獨特藥粥」收集了80種藥粥療法；楊今祥編著的「抗癌中草藥製劑」收集了289個製劑；文經社主編的「怎樣吃最健康」針對各種身體不適症狀，提供了118種不同的食物。基於此，藥用植物的栽培應先朝能使人們吃得健康且利用廣泛的植物來進行，又基於栽培成本及有效成份的考量，品種的好壞、適應性的強弱及經濟價值的有無等因子，是篩選值得研究發展作物上重要的指標。

桃園區農業改良場初步收集50種飲料類植物的試作觀察資料，在《鄉間小路》上陸續刊出，本期刊出系列之三。

16・雷公根

科名：繖形科 Umbelliferae

學名：*Centella asiatica* (L.) Urban

別名：老公根、地棠草、蚶殼草、含殼草、
蚋仔草、蚶殼仔草、積雪草、大葉金
錢草、崩口碗、連錢草、大馬蹄草、
崩大碗、破銅錢、銅錢草。

英名：Asiatic centella

植物形態

- 習性：多年生匍匐性草本，自生於路旁、田野及防風林下。
- 莖：常帶淡紫色，節上著生根及葉。
- 葉：單葉互生，圓形或腎形，基部凹，有寬鈍齒緣，具掌狀脈。
- 花：繖形花序，位於葉腋，花瓣5枚，紅紫色。
- 果實：雙果扁圓形，具稜而被隆起之網紋。

百草茶用部：全草

栽培管理

- 繁殖方法：種子、分株。
- 種植期：8～9月
花果期：3～6月（夏季）
收穫期：3月
- 採集調製：採全草鮮用或曬乾使用。
- 產量調查：
地上部鮮重：1.1kg / m²
地上部乾重：0.1kg / m²



■雷公根

效用：全草有祛風、固腸、明目、清暑、解毒之效。治腹痛、腹瀉、高血壓、疔瘡、咽喉腫痛、過敏性膚癢，並為兒科良藥。

1.習性：多年生草本。全株光滑無毛，具芳香。喜生濕潤路旁、草地。

- 莖：纖細匍匐性。
- 葉：葉互生，具長柄，近圓形，鈍淺裂，裂片7～9鋸齒緣，表面光滑，齒裂。葉背紫色。
- 花：頭狀之繖形花序，由3～15朵小花組合，白色帶粉紅色，花萼5枚，花瓣5枚，披針形，雄蕊5枚。
- 果實：分生果

百草茶用部：用全草

17・天胡荽

科名：繖形科 Umbelliferae

學名：*Hydrocotyle sibthorpioides* Lam.

別名：遍地錦、變地錦。

英名：Coin penny wort

植物形態

栽培管理

- 繁殖方法：分株
- 種植期：3月
開花期：4~6月
收穫期：1~12月
- 採集調製：採全草鮮用或曬乾使用。
- 產量調查：6月收穫
全草鮮重： $0.9\text{Kg}/\text{m}^2$
全草乾重： $0.1\text{Kg}/\text{m}^2$

效用：全草有清熱、利濕、化痰、止咳解毒、消炎功效。治感冒發熱、中暑、咽喉腫痛、百日咳等。

18. 馬蹄金

科名：旋花科 *Convolvulaceae*

學名：*Dichondra repens* Forst.

別名：馬茶金、小金錢草、小銅錢草、小元寶草、金鎖匙。

英名：*Dumbell dichondra*

植物形態

- 習性：多年生，匍匐狀細小草本，自生於山野、庭園之陰濕地。
- 莖：細長，多分枝，節上生不定根。
- 葉：互生，腎形至圓形，基部深心形，全緣。
- 花：花小，單生於葉腋，花冠鐘形，白或黃色，先端5裂。
- 果實：蒴果近球形。

百草茶用部：全草

栽培管理

- 繁殖方法：種子、分株。

- 種植期：9月
花果期：3~6月
收穫期：1~12月

- 採集調製：採全草鮮用或曬乾使用。

- 產量調查：5月收穫
全草鮮重： $1.6\text{kg}/\text{m}^2$
全草乾重： $0.3\text{kg}/\text{m}^2$

- 栽培特性：種於無遮蔭處，從6月起，因日照強烈，葉片變小。生育不良。

效用：全草有清熱、解毒、祛風、消炎之效。治虛勞、小兒胎毒、糖尿病、高血壓、腫毒、癰疔、腎炎水腫、黃疸、腹脹、腸胃炎、水腫、經閉。

19. 杜虹花

科名：馬鞭草科 *Verbenaceae*

學名：*Callicarpa formosana* Rolfe

別名：台灣紫珠、燈黃、粗糠仔、白粗糠仔、毛將軍、山檳榔。

英名：*Formosan beauty-berry*

植物形態

- 習性：常綠灌木，自生於河畔地。
- 莖：全株被茶褐色米糠樣物。株高可達2.5公尺。
- 葉：對生，長卵形或長橢圓形，葉厚紙質，粗糙，鋸齒緣。
- 花：腋生，聚繖花序，多數小花簇生，花冠白色或粉紅色，花絲著生於花筒而伸出花冠外。
- 果實：核果小球形，熟時紫色。

百草茶用部：嫩葉及根。

栽培管理

- 繁殖方法：種子、扦插。

- 種植期：4月中旬（種子繁殖）
花果期：第3年以後4~6月
收穫期：根3年以後全年可採，嫩葉於春夏採集。

- 採集調製：用嫩葉，採收嫩枝葉，切細曬乾使用。用根，挖根去粗表皮，切片曬乾使用。

- 產量調查：

3年生之根部鮮重： $3.5\text{kg}/\text{m}^2$
3年生之根部乾重： $2.3\text{kg}/\text{m}^2$

效用：根有補腎滋水、清血去瘀之效。莖葉有止血、散瘀、消炎、解毒功效。根治風濕、神經痛、老人手腳痠痛、喉痛、下消、白帶、眼疾。莖葉治咯血等。

■天胡荽



■馬蹄金



■杜虹花



- 繁殖方法：種子
- 種植期：3月下旬 8月
花果期：5~6月 9~10月
收穫期：6月~10月
- 採集調製：採全草切段，曬乾使用。
- 產量調查：6月收穫全草乾重 0.4 (kg / m²) 10月收穫全草乾重 0.3 (kg / m²)
- 栽培特性：土壤過濕容易死亡。
效用：治感冒發熱、濕熱黃疸、水腫、血壓過高症、口腔炎、牙周炎、婦女經閉、癰瘡腫毒。

植物形態

- 習性：多年生草本，自生於陽光充足之旱作及路旁。
- 莖：全草有毛，基部橫伏，上部斜上，全株被白色毛，莖近方形。
- 葉：對生，廣卵形，疏粗鋸齒緣。
- 花：花為繖形花序，四季開花，輪生於葉腋，花冠白色，筒狀唇形，上唇直立，下唇平展三裂。
- 果實：瘦果細小，卵平三稜形。

百草茶用部：全草

栽培管理

- 繁殖法：種子
- 種植期：3月下旬
花果期：4~10月
收穫期：5~10月
- 採集調製：採全草鮮用或曬乾使用。
- 產量調查：

收 穫 期	5 月 (kg / m ²)	8 月 (kg / m ²)
地上部鮮重	2.8	2.3
地上部乾重	0.5	0.4

- 效用：**全草有清熱、解毒、行血、消炎之效。治肺熱咳嗽、胸痛、腎虛、遺精、腸炎、盲腸炎、痢疾、子宮炎、中暑。外敷疔瘡、腫毒、毒蛇咬傷。

2 1 · 魚針草

科名：唇形科 Labiateae

學名：*Anisomeles indica* (L.) O. Ktze
別名：金劍草、抹草、臭天黃、虱母頭、白紫蘇。

植物形態

- 習性：一至二年生草本。
- 莖：四稜，全株被茸毛，上部多分枝，株高可達120公分。
- 葉：對生，闊卵形至卵形，先端漸尖，不規則鋸齒狀緣。
- 花：輪繖花序，層層排列成總狀花序，在下部為腋生，花冠為唇形，粉紅色，花萼鐘狀，為淺綠色。
- 果實：圓形小堅果，黑褐色。

百草茶用部：全草

栽培管理

- 繁殖方法：種子
- 種植期：5月上旬
花果期：9~12月
收穫期：12月
- 採集調製：採全草切段，曬乾使用。
- 產量調查：12月收穫
全草乾重：1.1kg / m²

- 效用：**全草有解熱、祛風、除濕、健胃、解毒、止痛、消腫之效。治感冒發熱、腹痛嘔吐、風濕骨痛、筋骨疼痛、濕疹、腫毒、毒蛇咬傷。

2 3 · 野薄荷

科名：唇形科 Labiateae

學名：*Mentha arvensis* L. var.
piperascens Malinv.

別名：仁丹草、薄荷、卜薄、蕃荷藥、南薄荷、貓兒薄荷、升陽藥、婆荷、夜息花。

英名：Mint

植物形態

- 習性：多年生草本，自生於水溝旁濕地。
- 莖：全株具芳香味，莖呈四稜形，株高可達50公分。

- 葉：對生，狹卵形，兩面有腺點，具毛。
- 花：穗狀繖房花序呈圓錐排列，頂生或腋生。花冠白色或淡紅色，唇形，四裂。

- 果實：堅果，呈橢圓形。

百草茶用部：全草

栽培管理

- 繁殖方法：種子、分株。
- 種植期：3月下旬。
花果期：7~9月。


■馬鞭草



■魚針草



■白花草



2 2 · 白花草

科名：唇形科 Labiateae

學名：*Leucas mollissima* Wall var.
chinensis Benth.

別名：白花仔草、虎咬廣、春草。

英名：Mountain-meadow-vine.Chinese
Leucas

收穫期：6、8月。

3. 採集調製：採全草鮮用或陰乾使用。

4. 產量調查：

收穫期	6月 (kg / m ²)	8月 (kg / m ²)
全草鮮重	1.9	1.6
全草乾重	0.4	0.4

利用：配合在百草原料中，主要為清涼可口，芳香的調味料。

效用：莖葉有解表、驅風、發汗、理氣、化濕、利尿、祛痰、活血、化瘀、止痛之效。治傷風感冒、頭痛、鼻塞、目赤、牙痛、胸膈脹滿、嘔吐、皮膚濕熱、小兒疳積、水腫、皮膚搔癢、崩漏、夏季感暑。

24. 仙草

科名：唇形科 Labiateae

學名：*Mesona procumbens* Hemsl.

別名：仙人草、仙人凍、涼粉草、仙草舅。

英名：Mesona

植物形態

1. 習性：一年生或越年生草本，自生於山麓濕地。
2. 莖：莖四稜形，莖下部伏地，方形，褐色或帶紫紅色，帶毛。
3. 葉：對生，卵形或卵狀長橢圓形，鋸齒緣，全葉皺縮狀，被毛。
4. 花：輪繖花序呈總狀排列，頂生或腋生，花淡紫色，花兩性，花萼合生鐘形，2裂，花冠為淡紫色或白色，上唇3裂，雄蕊4枚，花絲無毛特長，伸出花冠之外狀如貓鬚，故名貓鬚草，雌蕊1枚花柱底生，柱頭棍棒狀。
5. 果實：小堅果球形，表面網紋狀。

百草茶用部：莖葉

栽培管理

1. 繁殖方法：種子、扦插
2. 種植期：3月下旬
花果期：10~12月
收穫期：10月
3. 採集調製：割取地上部莖葉曬乾使用。
4. 產量調查：10月收穫
莖葉乾重：1.0kg / m²
5. 栽培特性：4~8月生育迅速，在栽培品系方面，各地方適合之品系不同，桃園區農業改良場及農業試驗所正在進行品種選育的計畫，截至目前的結果北部地區，以TYY3品質及產量較佳。

效用：莖葉有清暑、解渴、除熱毒、涼血、降血壓之效。治中暑、感冒、肌肉痛、關節痛、高血壓、糖尿病、腎臟病等。

25. 貓鬚草

科名：唇形科 Labiateae

學名：*Orthosiphon aristatus* (Blume.) Mig.

別名：化石草、腎草、小本化石草。

英名：Cat's whiskers

植物形態

1. 習性：多年生草本。
2. 莖：直立方形，暗紫色，株高可達150公分，基部木質化。斜臥土地部分易生不定根。
3. 葉：對生，狹或廣披針形，不規則鋸齒緣。
4. 花：花2~3朵排成總狀花序，兩性花，花萼合生鐘形，2裂，花冠為淡紫色或白色，上唇3裂，雄蕊4枚，花絲無毛特長，伸出花冠之外狀如貓鬚，故名貓鬚草，雌蕊1枚花柱底生，柱頭棍棒狀。
5. 果實：小堅果球形，表面網紋狀。

百草茶用部：莖葉

栽培管理

1. 繁殖方法：分株
2. 種植期：4月上旬
花果期：5~11月
收穫期：8~11月
3. 採集調製：割取地上部，切段、曬乾使用。
4. 產量調查：8月收穫，地上部乾重：1.0kg / m²

效用：莖葉有利尿、解熱、排石、消炎之效。治高血壓、腎炎、膀胱炎、肝炎、腎結石、膽結石、風濕性關節炎。

■野薄荷



■仙草



■貓鬚草

