



## 新品種花卉

# (八) 斑葉紫金牛

**斑**葉紫金牛是紫金牛(*Ardisia japonica* B)的斑葉品種，為屬於紫金牛科(Myrsinaceae)的小灌木，由於葉面常有一些斑紋，而且變化很多，很早就被拿來盆栽觀賞。

紫金牛的分佈很廣，在日本，從本州、四國、九州到北海道都有；在大陸的陝西和長江流域以南各地，則除了海南島未發現外，各省區都習見於海拔約1200公尺以下山間林下或竹林裡，陰溼的地方。另外，朝鮮半島和台灣也有，在台灣主要分佈於北部中央山脈海拔1800公尺以下山區。

我們中國人主要拿紫金牛的莖葉來作藥，在「本草綱目」裡，提到紫金牛時就說：『生福州，葉如茶葉，上綠下紫，結實圓，紅色如丹朱。根微紫色，八月採根，去心曝乾，頗似巴戟。』經現代藥理研究，也證實具有止咳、祛痰、平喘、抗菌和抗病毒等作用。

日本人則比較重視紫金牛的觀賞價值，他們自古稱紫金牛為「藪柑子」、「山橘」或「藪橘」。早先他們著重欣賞果實，約在1790年開始流行栽培紫金牛的斑葉品種，到1797-1798年間，一些介紹斑葉紫金牛的專著，紛紛出版，如『橘品』，收錄了45個品種；『素封篇』，登載了66個品種；而『橘品類考』和『橘品類考後篇』等，也是同時代

先後出版的專書，一直到1829年發行的『草木錦葉集』裡，還記載了白斑23種、黃斑8種、覆輪5種、別斑6種和其他12種，總共留下了54種斑葉紫金牛的詳細紀錄。可見日本人當時對斑葉紫金牛的瘋狂程度。

紫金牛是一種具有匍匐根莖的矮小灌木，近蔓性，直立莖長僅30

公分左右，不分枝，幼時被細微柔毛，老則脫落而光滑。單葉互生或輪生，葉片堅紙質或近革質，橢圓形至橢圓狀倒卵形，頂端急尖，基部楔形，長4-7公分，寬1.5-4公分，表面暗綠略帶紅暈，邊緣具細鋸齒且呈波狀，多少具腺點，兩面無毛或有時僅中脈被細微柔毛，側脈5-8對，細脈網狀。

5-6月間，於枝梢或葉腋，開粉紅色或白色小花，常3-5朵，排列成類似繖形花序。核果狀漿果，球形，直徑0.5-0.6公分，多數在11-12月間，由鮮紅色轉黑色成熟，有時5-6月間，樹上仍可見到果實。

除了葉片表面具有各種斑紋外，斑葉紫金牛的各部型態，大致和紫金牛相似，不同的是：人們栽培的目的，並不

在乎它們的花和果實，而只著重在葉面斑紋的表現。

通常日本流行什麼，台灣也跟著流行什麼。但是，日本

斑葉紫金牛流行之風，卻始終沒有吹來台灣，猜想是因為當時正是清朝乾隆、嘉慶年間，台灣尚未割讓日本，日本對台灣的影響力尚小。後來斑葉紫金牛在日本的熱潮也逐漸退去，所以，日據時期乃至台灣光復以後多年，斑葉紫金牛都沒有引進台灣，直

到近年，一種葉緣具不規則乳白色或白色斑紋的鑲邊紫金牛(cv. 'Marginata')，才出現在台灣花市，引起人們注意。

鑲邊紫金牛，通常盆栽觀賞，有時也作插花花材，可連盆全株用作底襯。除分株外，一般取約5公分長的新梢，切口先用水苔包裹，再每隔5公分扦插在水苔床裡，置塑膠棚中保護，每天以噴霧器(機)給水2-3次，大約經過3個星期，便可發根。種植時，可單用水苔，亦可用培養土，夏天要注意太陽強光，灼傷葉片。

大致來說，斑葉紫金牛類，是容易管理的室內矮小觀葉植物，非常適合現代小家庭擺飾，不論擺在客廳、起居室、書房，甚至臥房，效果都很好，確實值得大家重視。



■斑葉紫金牛是容易管理的小型觀葉植物，適合屋內擺飾。