



文圖 / 陳運造

異國風情木



名符其實 蝦子花



■ 栩栩如生的紅色蝦子花。

長；雄蕊12枚，著生於萼筒中部以下，均突出萼外；子房生於萼筒基部，無柄，矩圓形，2室，花柱細長，超過雄蕊，柱頭小，

胚珠多數。蒴果膜質，線狀長橢圓形，包藏在萼筒內，長約0.7公分，成熟時開裂成2果瓣；種子小而多，卵狀或橢圓形，平滑、紅棕色。

蝦子花名稱的來由，應和其花形、花色有關。我對它的第一印象，就是怎麼如此像炒紅的小蝦，勾起不少小時候到河裡撈蝦的回憶。主要花期在春季，以欣賞紅色花萼為主。除觀賞外，全株含鞣質，可提製栲膠。另據國外報導，乾燥花朵尚可治痢疾、肝病、燙傷和痔瘡等。

原產廣東、廣西及雲南的蝦子花，在中國大陸僅見於南方栽種，由於風土氣候相近，在台灣生長亦極良好，值得推廣。台灣原不產蝦子花屬植物，過去也沒有引進這屬植物紀錄，蝦子花的種植成功，等於為台灣帶來一種一屬新植物，增添花園多樣性的生力軍，更難能可貴的是它容易繁殖，一般以熟成的枝條扦插，成活率很高；播種亦可，只是苗木育成時間稍長。 [圖]

蝦子花是高3-5公尺的小灌木，有長而披散的分枝，開花時枝條彎垂，看起來像蔓性植物一樣，是庭園綠美化的好材料，近年自大陸引進台灣，已引起各方注意。

在植物學上，蝦子花屬於千屈菜科(Lythraceae)蝦子花屬(Woodfordia)，學名Woodfordia fruticosa(Linn.) Kurz。這一屬的植物全世界只有兩種，蝦子花產於中國大陸、越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼和馬達加斯加；另一種則產在非洲東部的衣索比亞(Ethiopia)。也有直接音譯屬名稱「吳福花」的，我想，吳福花很容易被人誤為「無福花」，還是「蝦子花」好。

蝦子花的葉片，對生，近革質，披針形或卵狀披針形，長3-14公分，寬1-4公分，頂端漸尖，基部圓形或心形，表面深綠色，通常無

毛；背面則多數被灰白色短柔毛，且有黑色腺點，偶亦有全部無毛者；無柄或近無柄。花腋生，1-15朵組成聚繖狀短圓錐花序，長約3公分，總花梗短，僅0.3-0.5公分長，基部有小苞片2枚；萼圓筒形，長0.9-1.5公分，鮮紅色，稍彎曲，近基部緊繃似花瓶狀，口部偏斜，裂片矩圓狀卵形，長約0.2公分；花瓣小而薄，淡黃色，線狀披針形，與花萼裂片等

