


戀戀水蜜桃 台灣組曲

拉拉山與新社鄉

採訪・攝影／林裕森





大漢溪在巴陵附近曲折迴繞

亞熱帶的豔陽，和冰涼的雲霧，
在台灣高山頂上競賽
拔河，讓來自北國溫帶的水蜜桃，
在台灣高山上結成了嬌貴甜美的果實。



網室栽培的小白
鳳水蜜桃

民國49年，中部橫貫公路正式通車，台灣的地理空間有了新的轉變。這條蜿蜒曲折的高山公路連接的，並不僅是台灣的西部和東部，也讓屬亞熱帶氣候區的西部平原，連接上了氣候寒涼的高山地帶。佔了大半空間的山脈，雖然讓窄小的台灣更加狹迫與阻隔，卻也讓小小的台灣島有了令人難以置信的豐富多彩，因為幾條橫貫公路的開通，溫帶水果園開始在台灣高山上有了發展的可能。來自北方的水梨、蘋果、蜜李、甜柿和水蜜桃，得以在一個南北僅有400公里長的島上，與鳳梨、香蕉、芒果、荔枝這些南島水果，共同為台灣的土地吐露芬芳。


本地產最鮮美熟甜

香軟多汁的水蜜桃，嬌嫩異常，不耐長途儲運，是在地人獨享的美味，除非提早採收，實無外銷的可能。也因此，進口水蜜桃永遠不及本地產品的鮮美熟甜。所以，在台灣產的眾多溫帶水果中，水蜜桃最是難得與珍貴，雖然台灣每年進口兩倍於本地產量的水蜜桃，但價格與受歡迎的程度都比不上台灣高山出產的水蜜桃，尤其是產自桃園縣復興鄉的拉拉山水蜜桃，更是名列台灣的極品水果。

台灣的水蜜桃主要產自中橫和北橫沿線，其中最重要的產區是中橫主線的梨山和宜蘭支線的武陵一帶，屬台中縣和平鄉境，是全國海拔最高，產量最豐的水蜜桃產地，因為氣候較寒冷，也是最晚上市的水蜜桃產區。

另外，中橫霧社支線，南投仁愛鄉的清境一帶也有相當多的水蜜桃園。在新竹縣，水蜜桃的種植集中在尖石鄉內，以新光和鎮西堡最為著名。不過全國各產區中，名氣最大的當屬北橫巴陵附近的拉拉山產區，雖然海拔較低，但是所出產的水蜜桃卻是最香甜多汁。

台灣農民最令人敬佩之處，除了高海拔地區成功地種植水蜜桃外，在低海拔地區也一樣可以種出美味的水蜜桃來，因為農業研究單位已成功選育出「低需冷量」的品種。在台灣3200多公頃的桃樹園裡，就有800公頃屬於平



上巴陵的網室水蜜桃

地水蜜桃，主要產自台中縣的新社和東勢一帶的台地與山坡上。因為產期更早，讓台灣的水蜜桃季節，可以從4月中旬一直延續到9月。

台灣桃引種三部曲

康熙23年(1684)，清廷頒布渡台禁令，當年編成的《台灣府誌》出現了種植桃樹的紀錄。

估計在明鄭時期就開始了台灣最早的桃樹種植。中國是桃樹的原產地，有4000多年的栽培歷史，而台灣早期稱為本地種的桃樹種源，都是移民自中國引進，種類相當多，較著名的有鶯歌桃、福州大桃、烏枝仔桃和歪尾桃等等。這一類的桃實，果肉質硬、果粒小的脆桃品種，在平地就能種植；現在市場上碩果僅存的，是果頂有鳥嘴狀突起的鶯歌桃。

日據時期曾經引進水蜜桃在山區種植，後來種源流失；水蜜桃真正在台灣生根，是在中橫通車的前兩年。經由農復會、台灣大學與中興大學的合作引種計畫，自日本和美國引進了近50種高海拔軟肉水蜜桃，開始在退輔會的實驗農場試種，40餘年來，台灣陸續引進了非常多元的水蜜桃品種。

水蜜桃的產期短，一般果農都利用種植不同成熟期的品種來進行產季調節，即使是小型農場也會種植許多不同品種。在拉拉山，早生種的水蜜桃，6月就可以開始採收了；而在梨山，有些晚生種甚至到9月才能採。



林金龍班長在上巴陵種植2.5公頃的水蜜桃



網室栽培的黃妃水蜜桃



上巴陵陡峭山坡上的水蜜桃園



拉拉山向陽坡地的水蜜桃園區

台灣高山地形陡峭，過度墾殖為環境帶來非常大的壓力，造成生態的嚴重負擔。為了讓水蜜桃的種植不要過度集中高海拔山區，從民國69年開始，農業試驗所開始了新的水蜜桃引種、品種改良與育種計畫，以培育種植於低海拔的水蜜桃為目標，引進更多的桃樹品種，並進行雜交育種。桃樹在冬季休眠期必須累積一定的低溫才能在隔年開花，每一個品種需要的需冷量，亦即低溫時數，都不相同；早期自美、日引進的水蜜桃品種都屬高需冷量品種，在溫暖的平地很難開花。

農委會農業試驗所園藝組在民國80年，首先成功的馴化引自巴西的平地水蜜桃，命





清境的桃花3月盛開



武陵農場的水蜜桃



拉拉山大紅鳳水蜜桃

名「台農甜蜜」，首次讓台灣的低海拔地區也可以種出果肉柔軟多汁、甜美香濃



黃妃水蜜桃

的水蜜桃，讓台灣水蜜桃正式進入低海拔時代。因為低海拔水蜜桃產期特別早，從4月底就可以開始採收，也讓本地水蜜桃的季節提前一個半月。經過多年的雜交育種，收集近3萬多顆種子與試種7000棵實生苗，在民國90年時，農試所又成功推出了全新的品種「春蜜」平地水蜜桃，比「台農甜蜜」的果實更大，酸度更低，而且產期更提早了兩周，雖然甜味較低，肉質略粗一點，卻更受市場喜愛。

預計未來將會有更多低需冷量的水蜜桃品種，讓台灣的水蜜桃有更多元的口味變化。



拉拉山小白鳳水蜜桃

拉拉山名氣最響亮

海拔1500公尺的上巴陵，是北橫往拉拉山與達觀山的必經之路，這裡正是拉拉山水蜜桃的精華區所在，也是北橫最早種植水蜜桃的地方。狹義的拉拉山水蜜桃，正是來自這一片經常雲霧裊繞的山間小村，和周圍極度陡峭的山坡上。這裡比梨山和武陵農場的海拔低，氣候也比較溫暖，蘋果和水梨等溫帶水果都因為不夠冷，幾乎無法在上巴陵開花結果，於是，除了少數的蜜李外，水蜜桃幾乎是拉拉山的獨佔性水果。因為不夠冷，拉拉山比較不適合種像「大久保」等極高需冷量的品種，但是卻讓水蜜桃口感更細軟多汁，更容易熟甜，也使得拉拉山的產季比梨山早一個月。

拉拉山剛好位在太平洋與台灣海峽水氣交會的地方，加上四周群山環繞，讓上巴陵以及鄰近的山區，在午後經常迷漫著寒涼的霧氣。這樣的環境除了天候多變、溫度起伏不定之外，也讓拉拉山地區的桃樹園有著地勢與面向的差別。最適合種植水蜜桃的地方，大多位居可以接收到早上陽光的向東山坡；朝西的山坡，常會在下午正要接收陽光時，就碰上太陽被雲霧所遮蔽的窘境。高海拔毫無遮蔽的豔陽，在拉拉山與來去不定的冰涼雲霧拉鋸著，山上的果農相信，在這樣的獨特環境裡，溫差大、日曬足、多石排水佳的土地，讓拉拉山結成了最是珍貴美味的水蜜桃果實。

現在，幾乎整個廣闊的復興鄉內所出產的水蜜桃都稱為拉拉山水蜜桃，全鄉現在種植的面積已經有450公頃，讓桃園成為僅次於台中的全國第二大水蜜桃產區。即使是離巴陵不遠，許多地方像三光、爺亨等海拔1000公尺以下的地方，種的其實是台農甜蜜和春蜜等平地水蜜桃品種，產期更早，5月就可採收，因為還是有不錯的日夜溫差，只要管理得當，品質並不輸更高海拔種的水蜜桃。隨著溫室效應的影響，拉拉山地區的氣溫也一樣逐年增高，許多較低海拔一千公尺以下的桃樹園，因為達不到足夠需冷量的關係，也都開始轉種低需冷量的平地水蜜桃

現在，幾乎整個廣闊的復興鄉內所出產的水蜜桃都稱為拉拉山水蜜桃，全鄉現在種植的面積已經有450公頃，讓桃園成為僅次於台中的全國第二大水蜜桃產區。即使是離巴陵不遠，許多地方像三光、爺亨等海拔1000公尺以下的地方，種的其實是台農甜蜜和春蜜等平地水蜜桃品種，產期更早，5月就可採收，因為還是有不錯的日夜溫差，只要管理得當，品質並不輸更高海拔種的水蜜桃。隨著溫室效應的影響，拉拉山地區的氣溫也一樣逐年增高，許多較低海拔一千公尺以下的桃樹園，因為達不到足夠需冷量的關係，也都開始轉種低需冷量的平地水蜜桃

了。

除了上巴陵，隔著三光溪河谷與拉拉山相對的光華，是另一個重要的拉拉山水蜜桃的精華區，因為面朝東北，可以接收早上的陽光，水蜜桃從1000公尺種到1500公尺的陡斜山坡上。沿著三光溪往上游，山勢轉而向東，到了又名嘎拉賀的新興，是另一個拉拉山的精華水蜜桃產區。在更狹隘的谷地頂，1500公尺的把加灣山旁，有一整片全面朝東的美麗山坡，絕佳的種植環境，生產出和上巴陵並駕齊驅的頂尖拉拉山水蜜桃。另外高義附近的夫婦山，是近年來較新興的產區，海拔更高，有更好的潛力。

因為名氣與價格，市面上越來越多的水蜜桃都掛上拉拉山的名號，如何買到正品變成困難的課題。即使拉拉山種植著早、中、晚熟的品種，但是拉拉山水蜜桃的產季也不出6-8月之間的3個月，其他的月份幾乎很難買到真正產自當地的水蜜桃。

比較穩當的方法，是向當地熟識且講究信用的果農直接購買，另外，復興鄉農會的供銷部也跟當地果農採購，經選果後直接銷售。每年，農會也依據果農購買套袋的數量配額，賣印有復興鄉水蜜桃的水果盒給果農，讓消費者可以依果盒來辨識，同時盒子上有標號，可以查出是由那一個果農所生產的水蜜桃。

其實，目前拉拉山水蜜桃有高達60%是在復興鄉內直接賣給遊客，其他30%由果農透過快遞公司外送直銷，剩下能賣到傳統水果市場的，約10%而已，所以真正拉拉山水蜜桃，在外地不容易買到。



巴陵攔沙壩

新社鄉的水果新貴

台中縣新社鄉是台灣最早試種平地水蜜桃的地方，台農甜蜜和春蜜等品種在正式命名之前，就已經在新社展開試種。因為開始得早，又加上環境適合，新社鄉是目前全國最大的平地水蜜桃產區，有廣達360公頃的平地水蜜桃園，



與拉拉山相對的光華是水蜜桃精華區



崑山產銷班生產優質水蜜桃



農試所位於霧峰的平地水蜜桃實驗園

幾乎佔了全國一半的面積。

新社鄉和東勢鎮是台中縣相鄰的兩個鄉鎮，同位在平原與中央山脈交會的地帶，因為多丘陵和台地，非常適合種植果樹，同為台中縣的水果之鄉，共同組成全國最重要的平地水蜜桃產區。新社出產的水果以枇杷與巨峰葡萄最為聞名，現在平地水蜜桃也開始成為新社鄉的招牌水果。

新社的水蜜桃主要種植在鄉內西北部和豐原市交界的崑山村內，有超過一半以上的新社水蜜桃園集中在這一帶，全村有100多公頃的桃樹園，村內的200多戶人家幾乎都種植水蜜桃。崑山位在海拔550公尺的台地上，是新社鄉北最高處。因為海拔的關係，加上地形開闊平坦，崑山比平地涼爽許多，冬季極低溫曾近0°C，而且日夜溫差特別大。這樣的條件不僅讓水蜜桃的風味更佳，而且讓水蜜桃的開花更順利，可以集中在1個月內開完，崑山的桃花季大約在每年1月中旬到2月中旬，比拉拉山3月開花早一個多月。因為是台地地形的關係，水蜜桃種在平坦的園地上，管理容易，也不會有坡地果園水土保持的問題。

新社的水蜜桃主要種植在鄉內西北部和豐原市交界的崑山村內，有超過一半以上的新社水蜜桃園集中在這一帶，全村有100多公頃的桃樹園，村內的200多戶人家幾乎都種植水蜜桃。崑山位在海拔550公尺的台地上，是新社鄉北最高處。因為海拔的關係，加上地形開闊平坦，崑山比平地涼爽許多，冬季極低溫曾近0°C，而且日夜溫差特別大。這樣的條件不僅讓水蜜桃的風味更佳，而且讓水蜜桃的開花更順利，可以集中在1個月內開完，崑山的桃花季大約在每年1月中旬到2月中旬，比拉拉山3月開花早一個多月。因為是台地地形的關係，水蜜桃種在平坦的園地上，管理容易，也不會有坡地果園水土保持的問題。



農業試驗所園藝組歐錫坤主任

在新社已經有16年種植桃樹經驗的高演勳是崑山果樹產銷班長，也是村內最傑出的水蜜桃果農，從鶯歌桃種起，高班長現在主要種植台農甜蜜和一些春蜜，另外也種植醃漬用的脆桃。



高演勳班長種的台農甜蜜

他種植的平地水蜜桃全部採用特殊的網室栽培，品質直逼拉拉山水蜜桃，但價格卻合理許多，他們將所產的水蜜桃稱為崑山甜桃。在崑山村內，水蜜桃果農大多圍4公尺高的邊網來防範果蠅，因為果蠅的活動範圍不超過4公尺，加上平地水蜜桃的產期較早，果蠅較少，所以只需邊網就足夠防範，成本更低，而且不用套袋，可以讓水蜜桃接收更多的陽光，成熟與轉色效果好，滋味也更香甜。

高演勳認為平地水蜜桃的挑選，跟高山水蜜桃差不多，一般在6月之前買到的幾乎都是平地水蜜桃，要注意挑選表皮的顏色要轉成白霧狀，不能帶綠色，而且轉成紅色的部份越多、越深，桃子會越甜熟。

平地水蜜桃，尤其是台農甜蜜，常會有尖狀突起，和扁圓的高山水蜜桃不太一樣，並不影響風味，果型的大小雖然會影響價格，但不一定越大就越好吃，不過，越重的水蜜桃一定會更美味多汁。

