

生醫用小型豬分娩舍管理

1. 待產母豬進舍

(1) 待產欄位之準備：

(a) 前一週完成下列之空欄位準備。

(i) 母豬進房前，以火燄徹底消毒欄床，飼料槽。

(ii) 檢查飲水器出水是否順暢清潔。

(iii) 準備好仔豬保溫燈，冬天仔豬保溫區須鋪麻布袋。

(2) 核對待產母豬之母豬卡之配種及預定分娩日期確定進舍頭數。時機為預訂分娩日前 3-10 日（附錄 1 表單編號 TAPS-DLT-3-01-01 母豬資料卡）

(3) 每週一將清點好之待產母豬於早晚涼爽未進食前移進分娩舍。

(4) 母豬移進前沖洗全身乾淨後，以適當濃度消毒液噴灑全身。分娩前一日以適當濃度消毒液噴灑擦淨外陰部及乳房部。

2. 母豬生產照護

(1) 隨時巡視，協助出生小豬保溫，排除意外。

(2) 隔 4 小時確認胎衣完全排出後，以適當濃度消毒液噴灑外陰部床面，預防產後感染。

(3) 豬隻如有異常情形，立刻通報獸醫處理。

3. 分娩舍母豬餵食管理

(1) 分娩舍內有待產母豬及哺乳母豬，餵飼方式不同：

(a) 哺乳母豬為豬場火車頭，為場內最重要的生產工具，如果哺乳失敗會影響小豬育成率並影響後續生長，同時造成下一胎次配種延誤。

(b) 待產母豬為即將分娩之母豬。

(2) 待產母豬餵飼方式：

(a) 每日上下午餵飼 2 餐，每餐 500g（粗蛋白質含量 15.4%）。

(b) 分娩前一個月至分娩前 3 天提高餵食量 0.5-1 倍，提供胚胎快速成長。

(c) 分娩前 3 天至當日降減餵飼量為每日 1000g（粗蛋白質含量 15.4%）母

豬料，如餵飼太多會造成母豬難產或分娩過程不舒服。

(d)如有出奶、不安、翹尾、羊水流出等分娩徵狀出現，應暫停餵飼。

(3)哺乳母豬餵飼方式：

(a)母豬生產後先給于少量飼料，試探其食欲，吃完再少量添餵。正常時，分娩後第3日會恢復食慾。

(b)哺乳母豬每日餵食3餐，每次約1公斤粒狀母豬料，並依照體型大小增減用量。原則上每日餵食量參考本公式： $2 \text{ 公斤} + (0.15 \times \text{仔豬頭數}) \text{ 公斤}$

(c)早、中、午分別餵食一餐。

(d)餵食後觀察母豬採食狀況，採食不佳情況即刻通報處理。

4.分娩舍哺育豬教槽管理

(1)哺乳仔豬2週齡時開始以教槽料（粗蛋白質含量18.1%）教槽。

(2)教槽初始，放少許飼料誘導，逐次漸增以當次時段能吃完為原則。

(3)每日餵飼3次，與母豬餵飼時間相同。

5.仔豬照護

(1)小型豬種母豬分娩過程很神經質，人員盡可不接近。但出生仔豬如太虛弱，協助其保溫及吸奶。

(2)於仔豬出生後第3日磅重、注射鐵劑、AR菌苗及標耳號。

(3)按日填報仔豬（賓朗豬、花班豬、蘭嶼豬、迷彩豬）的資料，資料內容包括豬隻的品種、性別、數目的增減等）。

(4)仔豬14日齡開始教槽，教槽盤使用前先火燄消毒過。

(5)仔豬六週齡離乳前完成豬瘟假性狂犬病疫苗注射，移舍作業，需有耐心，不可有拋豬強揣等粗暴動作。

6.母豬移出分娩舍回配種舍作業

(1)母豬預訂離乳當日僅餵少許約200公克日糧，避免漲奶引致乳房炎。

(2)欄位空出後，立刻清理消毒。