

作物栽培管理及病蟲害防治曆 / 編輯室

— 菊花 —

藥劑防治

防治對象	藥劑防治	稀釋倍數
菊花二點葉蟊	38 % 得氣蟊水懸劑	1500
菊花蚜蟲	90 % 納乃得可濕性粉劑	3000
	24 % 納乃得液劑	1000
	25.3 % 美文松乳劑	1000
	25 % 滅多松乳劑	1000
	50 % 達馬松溶液	2000
	70 % 福文松乳劑	2000
	50 % 雙美松溶液	2000
	40 % 裕馬松乳劑	1000
菊花薊馬	25 % 福化利乳劑	15000
	5.3 % 美文松乳劑	1000
	70 % 福文松乳劑	2000
菊花赤葉蟊	20 % 三亞蟊乳劑	800
	50 % 加力可乳劑	2000
	55 % 殺蟊多乳劑	2000
菊花莖腐病	50 % 貝芬替可濕性粉劑	1500
	53 % 貝芬得可濕性粉劑	1500
菊花白銹病	75 % 嘉保信可濕性粉劑	4000
	25 % 嘉保信乳劑	1000

項次	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
生育期													
電照時數				4 小時			3 小時				2 小時		
主要病蟲害發生期													
莖腐病													
白銹病													
黑斑病													
炭疽病													
黑銹病													
斑潛蠅													
薊馬													
蚜蟲													
葉蟊													

● 因各地氣候、土壤環境、栽植不同，此防治曆僅供參考之用