

如何防治玫瑰害虫

王清玲

玫瑰俗稱「花中之后」，為極受歡迎的庭院花木，栽植甚為普遍，然在生長發育的各階段常受各種昆蟲為害。近年來由於省內市場對花卉需求日益增加，加以日本、香港等外銷市場的開拓，玫瑰之栽培生產逐漸具經濟重要性，它的害虫亦漸受栽培者重視。

本省所生產的玫瑰不論供作切花或庭園種植，均為露地栽培。且為多年生植物，一旦種植即可終年生長，所以害虫種類繁多。據作者於民國68~70年間的調查，共搜集得28種之多，其中比較重要的害虫有6大類。本期先介紹蠅翅目、同翅目、鞘翅目等3類害虫的為害情形及防治法。

蠅翅目害虫

本目昆虫就是平常所稱之薊馬。在玫瑰上常見的有花薊馬、台灣花薊馬與中國薊馬等3種，薊馬是1種甚為細小的昆虫，虫體多不足1公厘。幼虫淡黃色，善爬行。成虫黃褐色或黑褐色，有翅會飛。本省因無嚴寒的冬季，所以終年不斷發生，在高溫乾燥的季節發生尤為猖獗，有時1朵花中可發現數十隻之多，薊馬在花瓣上的銼吸，會造成灰白色的斑痕，此種斑痕在顏色較深的花瓣上看來尤其明顯。為害嚴重時，甚至會使幼小花蕾無法正常伸展發育，而形成扭曲變形的花瓣。

防治法：薊馬發生時，可施用50%「達馬松」乳劑或75%「加保扶」可濕性粉劑2,000倍、或40.8%「陶斯松」乳劑1,500倍，每隔10天施藥1次。施藥時須注意噴及花部，並使藥液到達花內薊馬隱匿之處，以其達防治效果。有些品種玫瑰花瓣受濃度較高的藥液沾染後，易因藥害而生斑點，施藥時宜慎重，必要時可先試施於一小部分的花上，如無藥害，再大量施用。薊馬成虫具有飛翔能力，且寄主範圍很廣，因此很容易自他處飛來潛入花中，田間防治雖可降低密度



長金龜為害花朵

，但很難根絕。

同翅目害虫

(1) 蚜虫

玫瑰上常見的蚜虫有棉蚜、桃蚜、玫瑰蚜3種。多於初春時節出現，喜聚集在幼嫩枝條或花蕾上，吸取植物汁液。蚜虫在初形的花苞上吸食所造成的傷口，會在日後展開花瓣上留下點刻般的褐色痕跡，食痕周圍的花瓣亦有變色現象，嚴重時也會扭曲變形，大量聚集在枝條上的蚜虫，會使新生嫩芽細小、新葉畸形。此外，蚜虫亦可能為毒素病的媒介昆虫。

(2) 刺粉蝨

刺粉蝨以幼虫越多，於春季開始化蛹、羽化，大量增殖，一年4代。個體多棲息在葉片背面，幼虫自卵中孵化後就固定於葉背某處吸食，不喜移動，經3齡後化蛹，成虫有翅，遇驚擾即迅速飛離。發生多時，刺粉蝨黑色虫體滿布葉背，吸食汁液，常使樹勢衰弱。此外，已經羽化的蛹殼仍然黏附在葉背，並不隨成虫的羽化而脫落，因此雖然不再吸食為害，仍長期影响觀瞻。

防治法：施用50%「馬拉松」乳劑1,000 倍或75%「加保扶」可濕性粉劑3,000 倍液對蚜虫與刺粉蝨均有效。此外，於土壤中施用具有殺虫作用的粒劑，如「得波克」、「加保扶」等，亦可使藥劑藉由植株吸收而達到莖、葉等處，使蚜虫與刺粉蝨吸食後中毒死亡。粒劑施用後藥效開始發揮的較慢，但持續期間較長久。蚜虫與刺粉蝨的生物天敵種類均很多，尤其刺粉蝨的寄生蜂寄生能力很強，在自然環境中對刺粉蝨發揮極大抑制功能，施用粒劑可以避免農藥對天敵的毒害，具有保護天敵的作用。

鞘翅目害虫

(1)綠金龜

幼虫俗稱「雞母虫」，白色肥胖的體軀彎曲成U形。潛伏於根部附近土壤中，以土壤中腐植質或根部組織為食。成虫食害花蕾、葉片或幼嫩枝芽。成虫在5月左右羽化，因出現時間集中，通常一到羽化季節數目很多，因此往往一時之間造成大害，花與葉均被食成孔洞，葉片甚至被食成網目狀，其排泄物也在花、葉上造成明顯的污染。


(2)長金龜

幼虫潛伏在根部附近土壤中，成虫體呈褐色，較綠金龜小，但為害玫瑰較綠金龜更嚴重，且為害期間亦較綠金龜為長。成虫約在3、4月已開始出現，直到秋季才會漸漸消失。成虫白晝多隱匿於植株附近鬆軟土層中，夜間才爬至植株上取食葉片、花蕾等。在葉片上所造成的孔穴較綠金龜所造成者稍小，食過葉片大多成網目狀。

(3)黑小象鼻虫

個體很小，成虫體長僅3公厘左右，口吻向前方伸出，長約1公厘，全身均為黑色。成虫以口吻刺入幼嫩莖梢，取食莖部組織，並產卵於其內，因此造成莖部頂端的枯萎。每年4、5月成虫開始出現，直至9月左右才漸減少，平時棲息於莖梢，遇驚擾四肢收縮，墜落地上，然後趁機逃逸，幼虫於被害莖內取食並發育，老熟幼虫於土中化蛹。

防治法：在於鞘翅目害虫成虫開始出現時加強防治，一方面避免本身吸食植株，一方面避免其產卵，減少下一代發生的機會。此時可以施用「加保利」、



黑小象鼻虫為害葉片

枝葉上滿布蚜虫

「撲滅松」或「三氯松」等藥劑以殺死成虫，但因成虫多具有很強的飛翔能力，可隨時自附近其他作物上飛來為害，成虫的防治很難徹底。必要時亦可考慮於莖、葉上撒布「大利農」或「撲滅松」粉劑等，以產生忌避作用而減少成虫飛來為害。土壤中的幼虫，可施用土壤殺虫粒劑以滅絕。

金龜子亦喜在堆肥中產卵，因此施用堆肥時，宜先清除其中所藏的幼虫。