



玫瑰花欣賞 與利用

朱建鏞

玫瑰是薔薇屬之園藝栽培種的俗名，有花中之后的美譽。而薔薇屬的 (*Rosa*) 的植物通常被分成三類：1. 自生種薔薇 (*Species*)：凡植株自交的後代之性狀不會有分離現象者稱之為自生種，如 (多花) 薔薇 *R. multiflora*、玫瑰 (繡葉薔薇) *R. rugosa*、月季 (中國薔薇 *R. chinensis* 和光葉薔薇 *R. wichuraiana*...) 等。2. 古典玫瑰 (Old Rose)：由自生種薔薇相互雜交所得的品系，如阿爾巴玫瑰 (Albas)、大馬士革玫瑰 (Damasks)、法國玫瑰 (Gallicas)、雜交玫瑰 (Hybrid rugosas)、雜交麝香玫瑰 (Hybrid Musk)……等。3. 現代玫瑰 (Modern Rose)：即自 1867 年在法國育出雜交茶玫瑰 (Hybrid Tea 簡稱 H.T.) 的品種「法國」(La France)，以後所育出的品系還包括有中朵多花系 (Floribunda 簡稱 Fl.)、迷你玫瑰 (Miniature Rose) 和蔓性玫瑰 (Climbers)。在本省所栽培的玫瑰，絕大部份都是屬於現代玫瑰，因此本文所談的主角也只限於現代玫瑰。


雖然玫瑰推廣中心所推廣的玫瑰已近 700 種，但是迪奧 (Christian Dior) 這個品種雄霸台灣玫瑰切花市場 20 年，多數人的印象中，迪奧的花形一長蕾、高心

劍瓣，才是屬於玫瑰的花形，其實玫瑰花不只色彩變化多，其花形變化也多，每一個品系觀賞的方式不同，若以迪奧來代表玫瑰花多采多姿的世界，豈不像井底之蛙，以管窺天嗎？茲就品種各部份的特徵，逐一說明如何來欣賞玫瑰花。

一、花形：花形包括了蕾形與花開展的外形。

玫瑰的開花過程可分為緊蕾、 $\frac{1}{2}$ 開展、 $\frac{3}{4}$ 開展和盛開等四個階段 (見附圖)

圖 1 玫瑰開花過程的四個階段



左上：緊蕾

右上： $\frac{1}{2}$ 開展

左下： $\frac{3}{4}$ 開展

右下：盛開

1)。所謂蕾形是指緊蕾到 $1/2$ 開展這時期的花形，常見的蕾形有長形、球形、壺形和普通形（蕾下部份為球形，上部份為壺形）（見附圖 2）。蕾期的花形主要是欣賞蕾形優美的線條，和花蕾與其他部份器官的比例。以流行的趨勢，長形花蕾最受歡迎，普通形次之。H.T. 系統的品種

，除了線條以外，蕾形越大越長越好。

花形是指花開展到 $3/4$ 的程度，整個花形，有一個形態優雅的中心，花瓣開展非常均勻，沒有部份花瓣已展開而其他部份未展開的現象，花朵維持在最美的時間越長越好。至於形狀無論是高心形、球形、杯形或扁平都可以（見附圖 3），但是整個花形必需有幾近於圓的輪廓，而且中心的花瓣應稍微長，使整個花形有統一、均衡的美感。花朵大小在 H.T. 品系中要求較高，但對於中朵多花品系，只要花瓣排列整齊有統一、均衡的美感即可，花瓣數的多少或花朵大小並不重要。

二、花瓣的質地：包括花瓣的厚度和維持花朵形狀的強度。質地好的花瓣，不容

圖 2 玫瑰的蕾形





圖 3 玫瑰的花形



易萎凋、灼傷或折傷，而且即使在較惡劣的氣候環境，也不容易萎凋。在中朵多花系統中花瓣質地特別重要，好的瓣質還必需看起來乾淨，而且在花朵凋謝時，花瓣必需同時全部脫落。

三、花色：玫瑰的花色變化多端，根據美國玫瑰協會的分類可分為白色、黃色、深黃、黃色混合色、杏色混合色、橘色或橘色混合色、橘紅色、淡粉、粉紅色、深粉紅色、粉紅混合色、紅色、黑紅色、紅色混合色、紫紅色和赤褐色等16類，花色的好壞分成由蕾期到盛花（ $3/4$ 展開）和花朵全開兩個階段分別討論。前者講求花色要鮮明、乾淨和動人，如果花具有兩種以上顏色，則色彩之間必需能夠相互調和。花全開以後，花色應不褪色，尤其是粉紅和紅色系的花，尤其要注意不能有青化現象（即花色變為藍調的紅色）；在中朵多花系和迷你玫瑰中，由於每一花簇有數朵花，因此早開的花，若會褪色或青化，則很嚴重的破壞了整個花簇的色彩美。

四、香味：玫瑰的香味有十數種，有清香、水果香、濃郁的麝香…，依各人喜好而定，但有些品種的香味並非整天都有香味，花朵散發香味，有特定的時間。玫瑰的香味使玫瑰花更加完美，更受人喜歡。

五、枝與花頸：枝條的強度必需能夠支持整朵花的重量。從子房以下到最上葉片之間的部份稱為花頸，花頸要直，粗細和長度應與花朵大小成比例，在切花品種中，堅韌的花頸是不可缺少的特性之一；中朵多花系統和迷你玫瑰的花簇中每朵小花花頸的長度和生長的角度必需適當，才能使整個花簇各部份都非常均衡完美。

六、葉片：葉片好比是玫瑰花的衣裳，

在花朵未開時，葉片也是供欣賞的部份，一般革質葉有光澤，比紙質葉較討人喜歡。但最重要的是節間長度、葉片大小和葉的顏色是否能和花的大小成比例，和花色相調和。尤其是迷你型玫瑰，枝、葉、花三者之間的比例，是所有觀賞性狀中最重要者。

蔓性玫瑰中，有蔓性的雜交茶玫瑰、中朵多花系和迷你玫瑰，因此花朵的欣賞與其他系統相似；但在庭園栽培時要注意其開花特性，因為一般的蔓性玫瑰中開花較少，甚至有部份品種一年只開一季或兩季。

市面上所出售的切花，因為考慮到產量的問題，其單朵花的品質當然比不上比賽用的品質，因此喜好完美的花友，只有自己栽培了。不過切花品種的品質還是不錯的，不能自己培養玫瑰的花友，只好從選花的功夫下手了，尤其是本省切花分級尚未合理以前。

切花最常見的障害為折頸，折頸的原因主要是切花處理不當，枝條失水後引起的障害。這種切花往往花瓣永遠不會開展。第二種常見的為牛頭形的花（Bullhead

圖 4



俗稱雙心的牛頭形玫瑰花

），俗稱雙心，一般在冬季比較常見（如附圖 4），以前無知的花友還以為買到超大的花朵呢！這種牛頭形的花，花瓣有時不會展開，即使展開了，整朵花的花形呆滯不優美，沒有觀賞價值。在購買紅色系時，也要注意花色是否有青化現象，青化的花朵切花壽命較短。另外在冬天時還需要注意切花採收的成熟度，花瓣數多的品種，緊蕾的切花，也經常不能開展。

玫瑰是本省三大切花之一，結婚儀式所配載的胸花、捧花所用的花材，玫瑰是

最大眾化，也最受人們喜愛。在日常生活環境上，玫瑰也常被當作插花的花材。在插花上，她可以單獨使用，也可與其他花材一例如松、竹、梅、雪柳、柳類等木本花材，或如鐵砲百合、滿天星等草本花材。為了維持玫瑰良好的吸水性，插花時枝條基部在水中修剪，或將其枝條基部用火燒烤，當然也可以使用保鮮劑以延長切花壽命。如果切花已有失水萎凋的跡象，可以將花朵部份用報紙包住，枝條基部浸於 37°C 的溫水中，促進水分的吸收，待枝葉硬挺後再行插花。