


現代玫瑰

發展的歷史(二)

● 朱建鏞



中國薔薇、茶薔薇和中國茶薔薇

現代玫瑰有一半以上的血統是源自於原產亞洲（中國）的野薔薇；而東、西方薔薇的相互雜交是玫瑰花演進的重要關鍵，因此我們要感謝法國的約瑟芬（Josephine）女王，在她著名的御花園中收集了約 250 個品種的薔薇（其中經由名畫家赫路特（Redoute）畫成畫的有 181 品種，這些畫至今皆成為名畫），其中有一半屬法國薔薇類、8 種屬於大馬士革薔薇類、9 種白薔薇類、30 種百瓣薔薇類，一些綠苔薔薇類、21 種中國薔薇（月季）類和少數茶薔薇（香水月季）類。由於女王舉世聞名的收集，在這時期歐洲薔薇和亞洲薔薇可能開始自然的雜交，而中國茶薔薇（China-Tea Complex，即月季和香水月季的雜交後代）很快就散播於歐洲各地。這也是法國以後在玫瑰花的雜交育種大放異采的原因之一。

雜種的中國茶薔薇大致可分為 4 種基本類形：即月季、紅花月季、香水月季和淡黃花香水月季。而這些薔薇都是紅花月季（*Rosa*

chinensis semperflorens）和大花香水月季（*Rosa gigantea*）的突變種、自交或雜交的後代。上述 4 類又簡化分為中國薔薇類（月季）和茶薔薇類（香水月季）兩群，大約是在 18 世紀中葉或末葉傳入歐洲。雜種的中國茶薔薇最大的特色是具有常開花的特性，很不幸的這些品種都是二倍體，而與歐洲四倍體薔薇雜交所產生的後代為三倍體，絕大部分為不穩性，因此薔薇的改良工作又延緩了下來。但在 1840 年代時歐洲已有數百種中國茶薔薇這類雜交形的薔薇。

東、西方薔薇的雜交種

由於中國茶薔薇與歐洲薔薇栽植的逢機雜交，終於使薔薇的品種又邁進了另一個境界，因為新的雜交種具有中國茶薔薇（China-Tea Rose）常開花的特性，同時也具有歐洲薔薇耐寒的特性；例如來自法國義大利的波特

蘭薔薇 (Portland Rose)、美國的諾伊載特薔薇 (Noisette Rose) 或布邦島的布邦薔薇 (Bourbon Rose)。波特蘭薔薇是法國薔薇與中國薔薇雜交的後代，最早在義大利稱 “ Paestana ”，在法國則稱之為 “ Duchess of Portland ”，因此以後以 “ 波特蘭 ” 為這一類薔薇的名稱。波特蘭薔薇在當時是以「秋天也會開花」而聞名，然而波特蘭薔薇之重要性是因為其為雜交永花期薔薇 (Hybrid Perpetual Rose) 的祖先。

諾伊載特薔薇 (Noisette Rose) 是中國薔薇與麝香薔薇雜交的後代。在 1802 年美國南卡羅來那州的查理斯頓地方有位名叫 Philippe Noisette 送了一株麝香薔薇和 Chapney's Pink Cluster 品種的雜交實生苗給住在法國的兄弟 Louis Noisette。而約在 1830 年這株苗與 “ Parkes Yellow ” 品種 (屬中國薔薇類) 雜交產生了不少雜交的後代 (最後有數百種)。這些後代的花色為淡粉、淡黃和白色，植株多為蔓性或匍匐性，終年開花不斷，且耐霜



，在美、加地區頗受歡迎，尤其是美國南部地區。由於育種者為 Noisette 兄弟，因此這類薔薇稱為 “ Noisette Rose ”。

布爾邦薔薇 (Bourbon Rose) 源自於法國布爾邦島 (現已獨立)，當中國薔薇與秋花大馬士革薔薇同時被用作綠籬時而產生的雜交後代，這些雜交種被送到巴黎，而以後凡歐洲薔薇與中國茶薔薇的雜交的後代，也被稱為布爾邦薔薇，此時大約是在 1820 年代。但並不是所有歐洲薔薇與中國茶薔薇的後代都具有常開花的特性，因此凡不常開花的雜交種另歸成一類，稱之為雜種中國薔薇 (Hybrid China Rose)，而雜種中國薔薇就是雜交永花期薔薇的另一個親本。

雜種永花期薔薇 (Hybrid Perpetual Rose)：

約在 1837 年法國奧特伊 (Auteuil) 地方的拉菲 (Laffay) 先生將不常開花的雜種中國薔薇和波特蘭薔薇或布爾邦薔薇雜交所得到的雜交種稱之為雜種永花期薔薇 (Hybrid Perpetual Rose)。雖然大部分的雜種中國薔薇為不稔性 (3 倍體)，但仍有少數具稔性的 4 倍體品種，拉菲先生在 5 年之間就育出了 20 個品種，其中 “ Paul Neyrol ” 品種花徑達 17.5 公分，至今仍號稱世界最大的玫瑰花呢！

雜種永花期薔薇植株高大，生長勢強，花具有香味，可惜只有紅色、粉紅色花，缺少黃、橙色系品種，而且不耐熱。但是極受歐美人士所喜歡。因此在 1840 ~ 1880 的 40 年間所指的 “ 玫瑰花 ” 即是指雜種永花期薔薇，一直到 1890 年代才漸漸沒落由雜種茶薔薇 (Hybrid Tea Rose) 所取代。

現代的玫瑰花


大花系統玫瑰花 (雜種茶薔薇 H.T.)：

一般公認的第一種大花系玫瑰花為 “ 法國

”(La France)，其親本為“ Mme. Victor Verdier ” (屬雜種永花期薔薇) 和“ Mme. Bravy ” (屬茶薔薇)，於 1867 年由 J.B. Guillot 育出。也有人認為“ Mme. Victor Verdier ”才是第一種大花系玫瑰花，因為以前的雜種永花期薔薇多刺、葉粗糙，而“Mme. Victor Verdier ”幾乎無刺，葉光滑且也較常開花。在 1900 年以前大部分的大花系玫瑰為粉紅色，直到 1900 年英國的 Dickson 才育出真正的紅玫瑰——“自由”(Liberty)，1880 年起法國的“ Joseph Pernet ”利用黃色的野生種 *R. foetida persiana* 費了 14 年的功夫才育出第一種黃色的玫瑰“金色的太陽”(Soleild'Or)。

中朵簇生多花系(Floribundas)：

薔薇(*R. multiflora*)與月季(*R. chinensis*)雜交的後代稱之為多花薔薇類(Polyanthas)，第一種多花薔薇類的品種是“ Paquerette ”於 1875 年育出。而大約在 1900 年開始有人將多花薔薇類與大朵花系玫瑰雜交，其後代稱之為雜種多花薔薇(Hybrid Polyanthas)，丹麥的 Poulson 家族自 1910 年起執著於這類薔薇的改良育種，但由於多花薔薇為二倍體，大花系玫瑰是 4 倍體，其後代不稔性的問題又延遲了玫瑰的改良，約在 1920 年終於育出第一個品種，但一直到 1940 年以後才改用現代的多稱“ Floribunda ”中朵簇生



多花系玫瑰。近年來由於與大花系相互雜交，有些品種已經很難區別是歸屬那一類型。

迷你玫瑰(Miniature Roses)：

歐洲薔薇中如法國薔薇、大馬士革薔薇、白薔薇、百瓣薔薇，甚至綠苔薔薇都有自然變異的迷你型，而且在 1700 年代也頗為常見，但是自引進中國茶薔薇而且進行雜交育種以後，這些原生的迷你薔薇就消失了，約在 1800 年有一些迷你型的中國薔薇（月季 *R. chinensis minima*）引入歐洲，其中最有名的品種為 Banksia，在 1820～1850 年間迷你玫瑰的雜交育種頗為普通，但雜交茶薔薇和多花薔薇育出後，迷你薔薇再度被打入冷宮，一直到 1930 年代，美國的 Ralph Moore 努力發展的結果，經使迷你玫瑰在現代玫瑰占一席之地。後來

迷你玫瑰與原產日本的光葉薔薇（*R. wichuriana*）雜交又多了一些蔓性的迷你玫瑰。

蔓性玫瑰(Climbers)：

大花系玫瑰花很容易發生突變，枝條變成蔓性，而且原生野薔薇有的本來就是蔓性，也有由非蔓性變蔓性的，因此蔓性玫瑰可以說都是突變種。

由上述玫瑰花演進的歷史，現代玫瑰的祖先都是原產於中國的野薔薇，而整個玫瑰花的發展卻都是歐洲人的功勞，當我們欣賞玫瑰花之餘，不覺得汗顏嗎？縱觀今日世界的玫瑰花品種，除了上蒼賜與的突變種，又有那一種是由國人所育出呢？喜好玫瑰花的花友們，大家不妨互相加油，從事些育種工作。希望有朝一日大家能欣賞到由國人所育出的玫瑰花。