

——花型優美・香氣清高的——

玫瑰花

——中視今日農村 9月23日播出——



不但花型色彩優美，花瓣數也多，每一枝條均能長出一枝新芽，並能開一朵大花，適合花盆、庭院及以切花為目的的企業栽培。

另外還有四季開花中輪的

Floribunda(Pl.)及 Hybrid Polyantha (H. Pol.)，四季開花小輪的 Polyantha (Pol.)，矮性四季開花極小輪的 Miniatur Rose (Min.)

玫瑰花的品種很多，目前被栽培者所歡迎的有：四季開花的 Hybrid Rose (H.R.) 及 Pernetiana (Per.)，以及一季或兩季開花的 Hybrid Perpetual (H.P.)，草木灰做肥料。

選擇無病枝條

苗木的選擇，以接野薔薇的苗為最理想，但露天栽培就沒有這個限制。選擇苗木須先詳細檢查根部是否受損。太乾時在種植前浸於水中一天或種植在潮濕的沙土，並把細根整理剪掉，有病的枝條也要同時修剪，新梢有花芽則須去除，以防止養分的消耗。

等品種是適合花壇栽培的。玫瑰花的種植，要切實注意土質及種植環境。表土雖然要緊，但底土更重要，底土以排水良好的土壤為理想，且有充分的陽光及通氣良好。家庭庭園所用的種苗，最好選購兩年生的苗，有三、四支鋼筆大的枝條時為理想的移植時期。

不論苗的大小，先挖直徑五〇〇六〇公分，深六〇七〇公分的穴，於預定種植前一、二週內完成。表土及底土分別放置一邊。填土時先把表土放入二〇公分厚，並加入約三〇〇五〇〇公分的苦土石灰，攪拌後再加二〇公分左右的表土。如有腐熟的雞糞、油粕或洋菇堆肥，可加一點草木灰，數量依土地的肥瘦而定。

等新梢發芽到五、一〇公分時，就可追施上項肥料，至第二年春秋兩季可施用化學肥料，每株施用三〇〇五〇〇公分即可，亦可用油粕雞糞及草木灰做肥料。

苗木繁殖方法

玫瑰的整枝修剪，可使玫瑰開出優良的花朵，因為玫瑰的老枝及病枝是開不出好花朵的。修剪不只是調整開花，而且可以使枝條通風良好，防止病虫害發生。修剪必須注意剪掉老枝、弱枝及高枝條，才能開出好的花朵。

玫瑰苗木的繁殖方法有：實生法、扦插法、接木法、高壓法。實生法只為育成新品種時才採用，並且不普遍。扦插法普通都利用於砧木的繁殖。接木法有芽接及切接兩種，但是芽接，因為手續繁雜及

中耕施肥整枝

中耕能使土壤通氣良好，幫助吸收及生長。中耕可在植株根部八、一〇公分處挖鬆三、五公分，兼做除草工作，以免養分被雜草搶走。同時也可施用腐熟堆肥、雞糞或化學肥料。

注意防治病虫

玫瑰的主要病害有黑點病、白粉病、銹病、白星病及根瘤病。黑點病發生在老葉上，有同心圓型斑紋，目前尚無完全預防方法。本病高溫多濕時容易發生，必須事先預防。患病時可用大生M22及乙78五〇〇倍液每隔五天噴三、四次。白粉病與黑點病一樣，亦在高溫多濕時發生，先從葉片小枝條發生，患部似粘了麵粉一樣，常有徒長枝出現。應注意氮肥的

施用量及植株陽光充足，通風良好。發病時使用硫黃合劑一、五〇〇二、〇〇〇倍液，每隔二、三天連續噴射防治。銹病主要發生在葉片背面，有紅色的粉狀病斑，在春天枝條及葉柄也常會發生，可用大生乙七八及M二二泡水五〇〇倍噴射預防。虫害方面有蚜虫、葉蜂、介壳虫等。蚜虫在嫩芽花蕾上密生，吸收養分，乾燥期容易發生。可用馬拉松五〇〇一、〇〇〇倍液噴射。介壳虫為害玫瑰專吸樹液，玫瑰園通風不良時常會發生，可用馬拉松一、〇〇〇一、〇〇〇倍液或大滅速一、〇〇〇倍液防治。

成活率極低，目前很少採用。切接分春接（二、三月）及秋接（十、十一月），砧木用野生薔薇，接穗用前年生充實無病的枝條，發芽後即可移植。高壓法在本省相當盛行，本省由於氣候溫暖，全年都可進行高壓法。普通在開過花的枝條比較結實的地方，輪狀剝皮，然後用能吸水的水苔包裹，外層再用透明塑膠布包起來，等水苔中有小白根出現時，就可剪下，把所包的水苔小心清理、消毒後即可種植。