六、梨桑擬輪盾介殼蟲

學名：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targioni-Tozzetti, 1855)。
英文名：White peach scale。
異名：梨圓介殼蟲。
危害作物：

野百合屬、十大功勞、桑樹、玉山假沙梨、台灣泡桐、山櫻花、梨樹、桃、破布子、山香圓、梅樹等。

生活習性：

年發生5-6世代，寄主植物多，為雜食性害蟲。若蟲及雌成蟲固著於寄主植物的枝條、葉柄、葉背或果實，以刺吸式口器吸食為害。初齡若蟲體呈黃白色，若蟲蛻皮殼位於前方，蛻皮三次後變成蟲，介殼灰白至灰褐色。

危害特徵：

常群集於寄主植株枝條上危害，介殼互相重疊成一片白色，使植枝發育停止或衰弱而枯死。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40.64%加保扶水懸劑 (Carbofuran)	1公升	1,000	害蟲發生時每隔10天施藥一次，連續二次。	
40.8%陶斯松乳劑 (Chlorpyrifos)	0.6公升	2,000		

TACRI