莫拉克颱風 雜糧復育措施

雜糧復耕技術服務團—廖宜倫、沈勳、賴文龍、郭建志

莫拉克颱風重創南台灣，對中部沿海雜糧區造成嚴重傷害。在落花生方面，主要是鹽風及浸水所造成葉面乾枯，根部腐爛，以幼苗損害傷亡尤為嚴重。甘薯主要受損為葉面乾枯、塊根泡水影響品質，為降低農民財損，針對落花生及甘薯復耕及復育建議情形如下：

落花生

幼苗受損嚴重，不堪復育者，建議復耕，並注意病蟲害管理。復耕肥料用量建議每公頃施用140公斤硫酸銨、160公斤過磷酸鈣及50公斤氯化鉀，其他以正常落花生栽培法為之。

受損較輕微者，建議復育，復育時首重田間管理，疏通排水及殘敗枝葉，做好病蟲害防治，落花生葉斑病（藥劑：四氯異苯腈、鋅錳乃浦等）、落花生白絹病（藥劑：大克爛）。

甘藷

現甘藷已接近採收期，田間應加強清除排水，清除殘敗枝葉並加以翻蔓以利塊根生長，甘藷已成熟者應馬上予以收成。甘藷病蟲害防治方面以蟻象防治最為重要（藥劑：陶斯松）。肥培方面應施用少量肥量促進生長勢以回復正常生育，肥料用量建議每公頃施以40公斤硫酸銨及80公斤氯化鉀。

備註

1.每次施藥時，請勿同時混用多種藥劑，避免藥害及農藥殘留發生。

2.防治藥劑之增刪請參照主管機關之公告或參閱農藥資訊網(http://pesticide.baphiq.gov.tw/) 或植物保護手冊網路版(http://www.tactri.gov.tw/)。



▲農民於災後進行落花生復耕情形



▲農民於災戶進行落花生復育(施肥)



▲甘薯經復育後生長情形