

台灣原生杜鵑介紹

文、圖／蔡宛育

馬銀花

學名：*Rhododendron ovatum* Planch.

特徵：常綠性灌木或小喬木，分佈於中央山脈西側，大甲溪上游沿岸、南投縣沙里仙溪、九九峰等地。生長於河谷兩岸陡坡，生育地主要伴生植物有肖楠、五葉松、台灣二葉松及樺木、楓香等針闊葉混生地區。喜土壤溼潤之生長環境。葉光滑、革質，僅脈上具短毛，葉脈7-8對，葉端凹形。花芽分別生長近於枝端之葉腋，花冠粉紅色，花朵或白色或淡紫色、花單一朵。

花期：2-4月。

長卵葉馬銀花（新稱）

學名：*Rhododendron hyperythrum* Hayata.

特徵：常綠性灌木或小喬木，為台灣特有種，且數量不多，已被列為稀有植物之一。分佈於台灣海拔1,700-2,200公尺山區，主要生長於南投縣巒大山、卑南主山、高雄縣石山、六龜藤枝等地區。生長於冷涼溼潤之中海拔山區。葉紙質、光滑、長卵形，僅脈上有短毛，先端漸尖、側脈9-11對。花單一，分別生長於近枝端之葉腋，花冠白色、桃紅色、淡紫色。

花期：3月。

守城滿山紅（別稱守城杜鵑）

學名：*Rhododendron mariesii* Hemsl. & Wilson.

特徵：落葉性灌木或小喬木，分佈於台灣北部、中部海拔1,000-2,000公尺山區。主要生長在埔里、南投縣守城大山、南東眼山、關刀溪、日月潭、坪林等地均有生長。喜陽光，於土壤及空氣溼潤的環境中生長較良好。葉光滑、卵狀菱形、略革質，常2-3朵簇生枝端，葉背綠色，葉端銳形，中肋部及葉柄有毛。花芽多屬混合芽，即同時可以長葉又長花的芽體，且花先葉開花。花呈繖形花序、花冠桃紅色而密佈紫紅色小斑點、短鐘形、單一或2-3朵聚生。

花期：4-6月。

唐杜鵑（大屯杜鵑或中原氏杜鵑）

學名：*Rhododendron simsii* Planch.

特徵：常綠性灌木，生長於亞熱帶至熱帶低山地區的杜鵑類。在台灣主要分佈於海拔200-600公尺的山區，恆春半島、台北縣七星山、大屯山、石碇及屏東縣南仁山保護區，生長於向風坡面或近稜線之灌叢中。葉紙質，橢圓狀披針形至卵狀橢圓形，長2-5公分，側脈4-5對。花芽頂生，呈繖形花序，花冠漏斗形，顏色為朱紅色至暗紅色。

花期：2-6月。

細葉杜鵑

學名：*Rhododendron noriakianum* T. Suzuki.

別稱：志佳陽杜鵑、南湖大山杜鵑
特徵：常綠性灌木，葉為本省杜鵑中最小者，故名之。喜生長於透光



性佳的開闊地，常與高山芒或玉山箭竹低草生地混生或散生於台灣二葉松林中。為火災過後適存的植物，常生長成片。

花期：4-5月。

埔里杜鵑

學名：*Rhododendron breviperulatum* Hayata.

別稱：南澳杜鵑、毛柱杜鵑
特徵：常綠性灌木，生長於陡坡或新開闢的道路或崩塌地及低海拔二葉松及五葉松林中，耐貧瘠的土壤環境，適應性強。台灣特有種，生長於海拔400-2,500公尺之間，主要分佈區域在南投縣沙里仙溪、關刀溪、九九



峰、奧萬大及台灣中部埔里山區均可見。葉紙質，長橢圓形或倒卵形，表面疏生刺毛。2-5朵簇生枝頂，呈繖形花序、闊漏斗形，顏色穩定，主要為淡紫紅色。

花期：2-5月。

紅毛杜鵑（台灣高山杜鵑）

學名：*Rhododendron rubropilosum* Hayata.

特徵：常綠灌木，生長於陽光充足的開闊地或高山草原，耐貧瘠及乾燥的土壤。也分佈於台灣二葉松、華山松的疏林中，也常與玉山箭竹、巒大蕨及高山芒混生。



屬於先驅性的不耐陰之植物，也是中、高海拔山區火災後適存的植物種類。台灣特有種，分佈於台灣海拔1,000-3,600公尺山區的針葉樹林上部。主要見於南投縣陳有蘭溪、合歡山、巒大山、神木溪、能高越嶺線及嘉義縣阿里山、玉山等地。葉厚紙質，葉形形狀多樣，有卵狀披針形、長卵形、倒披針狀橢圓形及長橢圓狀披針形等。葉面粗糙，葉背則密佈灰褐色茸毛。1-5朵著生於枝頂，呈繖形花序，闊漏斗形，花冠粉紅或桃色。單株花的顏色頗富變化，由淺紫、桃紅、淡紫紅而深紫紅色。

花期：5-6月。

烏來杜鵑

學名：*Rhododendron kanehirai* Wilson.

特徵：常綠灌木，台灣特有種，已被列為稀有植物之一。喜生長於溫暖而潮溼的環境。或出現在溪畔岩石縫隙中，耐蔭力強，為本省野生杜鵑中植群數量最少的一種。主要分佈在台灣北部海拔200-800公尺山區，如北勢溪沿岸的岩隙間、乾溝、石碇、文山區、小格頭及鸞潭潭等地區。植株高可達1-2公尺，葉紙質，線狀披針形至長橢圓狀披針形。1-5朵頂生，呈繖形花序，花冠為淡紫紅色。

花期：3月。

金毛杜鵑

學名：*Rhododendron oldhamii* Maxim.

特徵：常綠灌木或小喬木，台灣特有種，多見於陽光充足的開闊地、林緣、林道、產業道路兩旁坡路、河谷崖壁及崩塌地等。適應力強，尤耐貧瘠的土壤，在台灣是極為常見的野生種類。普遍生長於台灣全島至海拔3,000公尺高地，幾乎全省各地皆可

見到，尤以北部淡水、石碇、大屯山多產之；奧萬大、中橫、南橫、丹大溪、九九峰、瑞岩溪、南東眼山、日月潭等地亦有發現。葉紙

質，倒卵形、卵形或披針狀長橢圓形。1-5朵頂生花，呈繖形花序，朱紅色，花冠漏斗形，呈紅色，花期長，除寒冬外，幾乎全省各地經年可見陸續不斷的開花。

花期：3-4月。

