九、梨 柑 桔 捲 葉 蚜

學名：*Aphis citricola* van der Goot
英名：Pear green aphid
生活習性：

雌成蟲營單性生殖，成、若蟲均喜棲息於嫩芽葉背吸食汁液，繁殖甚速，以春芽發生較普遍，秋芽亦會發生，遇雨季族群即下降。

危害特徵：嚴重發生時，葉變黑皺縮，生育受阻。
防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥 劑 名 稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
20%亞滅培可溶性粉劑 (Acetamiprid)	0.3-0.4公升	4,000	蚜蟲發生時施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%丁基加保扶可濕性粉劑 (Carbosulfan)	1-1.5公斤	1,200	蚜蟲發生時，施藥一次，其後視發生情形，隔14天再施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	0.6-0.75公升	2,000	蚜蟲發生時施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40.64%加保扶水懸劑 (Carbofuran)	1公升	1,200	蚜蟲發生時施藥一次，其後視發生情形，隔2星期後再施藥一次。	
40.8%陶斯松乳劑 (Chlorpyrifos)	0.6公升	2,000		
25%殺松乳劑 (Acephate)	1-3公升	750	蚜蟲發生時，每10天施藥一次，連續二次。	採收前9天停止施藥。
45%克硫松可濕性粉劑 (Chlorthiophos)	1-2公斤	1,000		
30%裕必松可濕性粉劑 (Phosalone)	1-2公斤	1,000	蚜蟲發生時施藥一次。	採收前15天停止施藥。