二、果實套袋

目前台灣有不少果樹適合進行套袋，如番石榴、桃、高接梨、檬果等。依照作物果實品質需求的不同，有其獨特的套袋材質與技術，但是都能產生阻隔東方果實蠅產卵的效果，只要從幼果期開始套袋，就能保護果實免於遭受東方果實蠅的危害。

三、藥劑防治

當園內東方果實蠅族群密度高時，可以施用植物保護手冊推薦於該作物的東方果實蠅防治藥劑，進行全園噴灑撲殺的快速防除，施用時要注意該藥劑的每公頃每次施藥量、稀釋倍數、施藥方法與安全採收期，以達到較佳的防治效果，並且避免農藥殘留的風險。藥劑防治看似省工速效，可是藥劑效果只能擊殺園內成蟲或驅離雌成蟲前來產卵，但是成蟲分散能力強，噴灑藥劑不易對成蟲族群產生明顯的防治成效；而幼蟲藏匿於果實內難以直接毒殺，因此除非東方果實蠅在園內的族群密度已經過高需要進行快速防治，或者是採收結束後要進行清園工作，否則不建議使用藥劑防治。





▲應用黃色黏板或黏劑防治東方果實蠅

四、使用黃色黏板或黏劑

東方果實蠅成蟲對於黃色有明顯偏好，因此在園中懸掛黃色黏板或將黃色黏劑噴於白色塑膠罐，皆可以引誘到已存在於園中的東方果實蠅，減低園內東方果實蠅的族群密度，但由於很多昆蟲對於黃色亦有偏好，因此需經常前往檢視與更換，以免被其他昆蟲佔滿黏板，失去防治東方果實蠅之效用，且容易受到天候影響而減少其防治能力。

表一、植物保護手冊推薦使用於全園噴灑的防治藥劑

登記作物	藥劑名稱	推薦倍數	安全採收期
柑桔	20%芬化利乳劑	2,000倍	9天
柑桔	50%芬殺松乳劑	1,000倍	21天
檬果	2.4%第滅寧水懸劑	1,500倍	12天
檬果	50%芬殺松乳劑	1,000倍	12天
番荔枝	20%芬化利乳劑	2,000倍	9天
番荔枝	50%芬殺松乳劑	1,000倍	6天
楊桃	50%芬殺松乳劑	1,000倍	9天
楊桃	20%芬化利乳劑	2,000倍	18天
楊桃	5%賽扶寧水基乳劑	1,600倍	21天
蓮霧	5%賽扶寧水基乳劑	1,600倍	15天